# **DERIVATE DELLE FUNZIONI**

esercizi proposti dal Prof. Gianluigi Trivia

14 ottobre 2025

### Incremento della variabile indipendente e della funzione.

Se x,  $x_1$  sono due valori della variabile indipendente x,  $y = f(x_2)$  e  $y_1 = f(x_1)$  le corrispondenti immagini, allora

$$\triangle x = x_1 - x$$

è detto incremento della variabile x, e

$$\triangle y = y_1 - y = f(x_1) - f(x) = f(\triangle x + x) - f(x)$$

è detto incremento della funzione.

Il rapporto

$$\frac{\triangle y}{\triangle x}$$

è detto rapporto incrementale della funzione.

Si chiama derivata della funzione f(x) rispetto alla variabile x, e si indica con  $y' = \frac{dy}{dx}$ , il limite, se esiste, del rapporto incrementale al tendere a zero dell'incremento della variabile x, cioè

$$y' = \lim_{\triangle x \to 0} \frac{\triangle y}{\triangle x}$$

La grandezza algebrica della derivata esprime il coefficiente angolare della tangente nel punto x del grafico della funzione f(x). La derivata esprime la velocità di variazione della funzione nel punto considerato.

**Esempio.** Trovare la derivata della funzione  $y = x^2$ 

Calcoliamo il rapporto incrementale

$$\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{f(x + \triangle x) - f(x)}{\triangle x} = \frac{(x + \triangle x)^2 - x^2}{\triangle x} = \frac{2x\triangle x + (\triangle x)^2}{\triangle x}$$

Calcoliamo il limite di tale rapporto

$$\lim_{\triangle x \rightarrow 0} \frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{\triangle x \left(2x + \triangle x\right)}{\triangle x} = 2x$$

**Esercizio 1.** Trovare l'incremento della funzione  $y = x^2$  corrispondente alla variazione dell'argomento:

• da x = 1 a  $x_1 = 2$ : calcoliamo  $\triangle y$ 

$$\triangle y = 4 - 1 = 3$$

**Esercizio 2.** Calcolare  $\triangle y$  per la funzione  $y = \sqrt[3]{x}$ , se x = a e  $\triangle x = h$ 

**Soluzione.** sappiamo che  $\Delta y = y_1 - y$ , dove  $y_1$  e y sono le immagini di  $x_1$ e x. Troviamo  $x_1$ 

$$x_1 = x + \triangle x = a + h$$

pertanto

$$y_1 = \sqrt[3]{a+h}$$
$$y = \sqrt[3]{a}$$

da cui

$$\triangle y = \sqrt[3]{a+h} - \sqrt[3]{a}$$

# Rapporto incrementale

Esercizio 3. Calcolare l'incremento  $\triangle y$  ed il rapporto incrementale per le funzioni:

 $y=\frac{1}{(x^2-2)^2}$  per x=1e $\triangle x=0,4$ : calcoliamo  $x_1$ 

$$x_1 = 1 + 0, 4 = 1, 4 = \frac{7}{5}$$

per cui

$$\triangle y = 625 - 1 = 624$$

il rapporto incrementale sarà

$$\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{624}{\frac{2}{5}} = 1560$$

**Esercizio 4.** Determinare  $\Delta y$  e il rapporto incrementale corrispondenti alle variazioni dell'argomento da x a  $x + \Delta x$  per le funzioni:

• y = ax + b:

$$\triangle y = y_1 - y = a(x + \triangle x) + b - ax + b = a\triangle x$$

il rapporto incrementale sarà

$$\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{a\triangle x}{\triangle x} = a$$

•  $y = x^3$ :

$$\triangle y = y_1 - y = (x + \triangle x)^3 - x^3$$
  
=  $3x^2 \triangle x + 3x (\triangle x)^2 + (\triangle x)^3$ 

il rapporto incrementale sarà

$$\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{3x^2 \triangle x + 3x (\triangle x)^2 + (\triangle x)^3}{\triangle x} = 3x^2 + 3x \triangle x + (\triangle x)^2$$

•  $y = \sqrt{x}$ :

$$\triangle y = y_1 - y = \sqrt{(x + \triangle x)} - \sqrt{x}$$

il rapporto incrementale sarà

$$\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{\sqrt{(x + \triangle x)} - \sqrt{x}}{\triangle x}$$

razionalizzando il numeratore, si ottiene infine

$$\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{(x + \triangle x) - x}{\left(\sqrt{(x + \triangle x)} + \sqrt{x}\right) \triangle x} = \frac{1}{\sqrt{(x + \triangle x)} + \sqrt{x}}$$

3

 $y = \ln x$ :

$$\triangle y = y_1 - y = \ln(x + \triangle x) - \ln x$$

il rapporto incrementale sarà

$$\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{\ln(x + \triangle x) - \ln x}{\triangle x}$$

applicando la proprietà dei logaritmi  $\ln a - \ln b = \ln \left(\frac{a}{b}\right)$ , si ottiene

$$\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{\ln\left(\frac{x + \triangle x}{x}\right)}{\triangle x} = \frac{\ln\left(1 + \frac{\triangle x}{x}\right)}{\triangle x}$$

**Esercizio 5.** Data la funzione  $f(x) = 2x^2 + 3x + 4$ , trova e semplifica ognuno dei seguenti: a) f(5 + h); b)  $\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ .

**Soluzione.** a) Calcoliamo f(5+h), ponendo di x=5+h; avremo

$$2(5+h)^2 + 3(5+h) + 4 = 50 + 20h + 2h^2 + 15 + 3h = 2h^2 + 23h + 65$$

b) calcoliamo il rapporto incrementale indicato


$$f(2+h) = 8 + 8h + 2h^2 + 6 + 3h + 4 = 2h^2 + 11h + 18$$
  $f(2) = 8 + 6 + 4 = 18$ 

per cui

$$\frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \frac{18+11h+2h^2-18}{h} = \frac{h(2h+11)}{h} = 2h+11$$

Esercizio 6. Determinare il coefficiente angolare della secante alla parabola  $y = 2x - x^2$  se le ascisse dei punti di intersezione sono:

•  $x_1 = 1$  e  $x_2 = 2$ : osserviamo la figura



 $\triangle x = x_2 - x_1 = 1$  e  $\triangle y = y_2 - y_1 = (4 - 4) - (2 - 1) = -1$ ; il coefficiente angolare è uguale alla tangente dell'angolo indicato in figura come  $\alpha$ , per cui

$$m = \tan \alpha = \frac{-1}{1} = -1$$

Esercizio 7. La legge di moto di un punto è  $s = 2t^2 + 3t + 5$ , con s in cm e t in s. Qual è la velocità media nell'intervallo di tempo compreso tra gli istanti t = 1 e t = 5?

**Soluzione.** la velocità media per definizione è data dal rapporto  $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ , cioè il rapporto incrementale della legge oraria, vista come s = f(t). Calcoliamo i due incrementi

$$\begin{cases}
\triangle s = s_5 - s_1 = 50 + 15 + 5 - 2 - 3 - 5 = 60 m \\
\triangle t = t_5 - t_1 = 5 - 1 = 4 s
\end{cases}$$

il rapporto incrementale, e quindi la velocità media, sarà

$$\frac{\triangle s}{\triangle t} = \frac{60 \, m}{4 \, s} = 15 \frac{m}{s}$$

[il calcolo della velocità media corrisponde alla individuazione del coefficiente angolare della retta secante nei due punti assegnati, la curva che esprime la legge oraria.

Esercizio 8. Determinare il rapporto  $\frac{\triangle y}{\triangle x}$  per la funzione  $y=\frac{1}{x}$  nel punto x=2 per  $\triangle x=0,01$ .

**Soluzione.** Da  $\triangle x = 0.01$  e x = 2, si può ottenere

$$x_1 = x + \triangle x = 2.01$$

da cui

$$\triangle y = \frac{1}{2.01} - \frac{1}{2} = \frac{-0.01}{4.02}$$

da cui

$$\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{-\frac{0.01}{4.02}}{0.01} = -\frac{1}{4.02} = -\frac{50}{201}$$

**Esercizio 9.** Un insegnante di matematica ha scoperto che, dopo aver dato al suo cane Django un nuovo tipo di cibo, il peso di Django cominciò ad aumentare. Dopo x settimane col nuovo cibo, il peso di Django in kg era dato approssimativamente dato da  $w(x) = \sqrt{x} + 40$  per  $0 \le x \le 6$ . Trova il tasso di cambiamento del peso di Django dopo x settimane.

**Soluzione.** Primo passo:  $w(x+h) = \sqrt{x+h} + 40$ .

Secondo passo:  $w(x+h) - w(x) = \sqrt{x+h} + 40 - (\sqrt{x} + 40) = \sqrt{x+h} - \sqrt{x}$ 

Terzo passo:  $\frac{w(x+h)-w(x)}{h} = \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$ 

Per poter dividere per h, moltiplicare sia il numeratore che il denominatore per  $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$ ; cioè, razionalizzare il numeratore.

$$\frac{w\left(x+h\right)-w\left(x\right)}{h}=\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}\cdot\frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}=$$

$$\frac{x+h-x}{h\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{h}{h\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}$$

Quarto passo:

$$\lim_{h \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Questo ci dice, ad esempio, che dopo 4 settimane, quando il peso di Django è  $w\left(4\right)=\sqrt{4}+40=42\,kg$ , il suo peso sta aumentando ad una velocità di  $w'\left(4\right)=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{4}\,\frac{kg}{sett}$ .

### Limite del rapporto incrementale

**Esercizio 10.** Calcolare la derivata della funzione  $y = \tan x$ 

**Soluzione.** la derivata è il limite del rapporto incrementale per  $\triangle x \to 0$ . Calcoliamo prima il rapporto incrementale

$$\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{\tan(x + \triangle x) - \tan x}{\triangle x} =$$

$$= \frac{\frac{\sin(x + \triangle x)}{\cos(x + \triangle x)} - \frac{\sin x}{\cos x}}{\triangle x} =$$

$$= \frac{\frac{\sin x \cos \triangle x + \cos x \sin \triangle x}{\cos x \cos \triangle x - \sin x \sin \triangle x} - \frac{\sin x}{\cos x}}{\triangle x} =$$

$$= \frac{\cos^2 x \sin \triangle x + \sin^2 x \sin \triangle x}{\triangle x \cos x (\cos x \cos \triangle x - \sin x \sin \triangle x)} =$$

$$= \frac{\sin \triangle x}{\triangle x \cos x (\cos x \cos \triangle x - \sin x \sin \triangle x)}$$

calcoliamo il limite di tale rapporto

$$\lim_{\triangle x \to 0} \frac{\sin \triangle x}{\triangle x \cos x (\cos x \cos \triangle x - \sin x \sin \triangle x)} = \lim_{\triangle x \to 0} \frac{\sin \triangle x}{\triangle x} \cdot \frac{1}{\cos x \cos (x + \triangle x)} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

# Regole principali di calcolo delle derivate

#### Tabella riassuntiva

Se c è una costante e f(x) e g(x) sono le funzioni derivabili, allora

$$\begin{split} \left(c\right)^{'} &= 0 & \left(cf\left(x\right)\right)^{'} = cf^{'}\left(x\right) \\ \left(x\right)^{'} &= 1 & \left(f\left(x\right)g\left(x\right)\right)^{'} = f^{'}\left(x\right)g\left(x\right) + f\left(x\right)g^{'}\left(x\right) \\ \left(f\left(x\right) \pm g\left(x\right)\right)^{'} &= \frac{f^{'}\left(x\right)g\left(x\right) - g^{'}\left(x\right)f\left(x\right)}{\left(g\left(x\right)\right)^{2}} \end{split}$$

#### Tavola delle derivate delle funzioni principali

$$(x^n)' = nx^{n-1} \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ per } |x| < 1$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\cos x)' = -\sin x \qquad (e^x)' = e^x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \qquad (\ln x)' = \frac{1}{x} \qquad x > 0$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \qquad (\log_a x)' = \frac{\log_a e}{x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ per } |x| < 1$$

Regola di derivazione per le funzioni composte

Se y = f(z) ed z = g(x), cioè y = f[g(x)], dove le funzioni f, g sono derivabili, allora

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$$

Esempio:

$$y = (x^2 - 2x + 3)^5$$

poniamo  $y = z^5$ , dove  $z = (x^2 - 2x + 3)$ . Si ha quindi

$$y' = (z^5)'_z (x^2 - 2x + 3) x' = 5z^4 (2x - 2) = 10 (x - 1) (x^2 - 2x + 3)^4$$

### Esercizi di derivazione

#### Funzioni algebriche

Esercizio 11. Calcola le derivate delle funzioni assegnate:

 $y = x^5 - 4x^3 + 2x - 3$ : applichiamo la regola delle derivate di una potenza  $(x^n)' = nx^{n-1}$  ai singoli termini del polinomio e la derivazione di una costante per il termine noto (c)' = 0

$$y' = 5x^4 - 12x^2 + 2$$

Esercizio 12.  $y = \frac{1}{4} - \frac{1}{3}x + x^2 - 0.5x^4$ : per le funzioni polinomiali utilizziamo sempre la regola di derivazione delle potenze  $(x^n)' = nx^{n-1}$ 

$$y^{'} = -\frac{1}{3} + 2x - 2x^{3}$$

**Esercizio 13.**  $y = -\frac{5x^3}{a}$ :

$$y' = -\frac{15x^2}{a}$$

Esercizio 14.  $y = at^m + bt^{m+n}$ : la stessa regola di derivazione in un caso tutto algebrico

$$y' = amt^{m-1} + b(m+n)t^{m+n-1}$$

7

Esercizio 15.  $y = \frac{ax^6 + b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ : la derivata è rispetto alla variabile x, tutte le altre lettere sono considerate come costanti

$$y' = \frac{6ax^5}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Esercizio 16.  $y=\frac{\pi}{x}+\ln 2$ : anche qui  $\pi$  e  $\ln 2$  rappresentano dei valori numerici costanti, mentre  $\frac{1}{x}=x^{-1}$ 

$$y' = -\frac{\pi}{x^2}$$

**Esercizio 17.**  $y = 3x^{\frac{2}{3}} - 2x^{\frac{5}{2}} + x^{-3}$ : potenze con esponente negativo e razionale, cioè radici cubiche e quadrate; tutti questi termini possono sempre essere trattati secondo la regola della derivazione di una potenza

$$y' = 2x^{\frac{2}{3}-1} - 5x^{\frac{5}{2}-1} - 3x^{-3-1} = 2x^{-\frac{1}{3}} - 5x^{\frac{3}{2}} - 3x^{-4}$$

**Esercizio 18.**  $y = x^2 \sqrt[3]{x^2}$ : questa funzione può essere riscritta sotto forma di un'unica potenza:  $y = x^2 x^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{8}{3}}$ 

$$y' = \frac{8}{3}x^{\frac{5}{3}} = \frac{8}{3}\sqrt[3]{x^5} = \frac{8}{3}x\sqrt[3]{x^2}$$

**Esercizio 19.**  $y = \frac{a}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{b}{x\sqrt[3]{x}}$ : trasformiamo le radici al denominatore come potenze con esponente frazionario negativo:  $y = ax^{-\frac{2}{3}} - bx^{-\frac{4}{3}}$ 

$$y' = -\frac{2}{3}ax^{-\frac{5}{3}} + \frac{4}{3}bx^{-\frac{7}{3}}$$

Esercizio 20.  $y = \frac{2x+3}{x^2-5x+5}$ : questa è una funzione polinomiale fratta; la sua derivata viene calcolata applicando la derivazione delle singole potenze al numeratore e al denominatore e la regola di derivazione di un rapporto  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f^{'}(x)g(x)-g^{'}(x)f(x)}{(g(x))^2}$ 

$$y' = \frac{2x^2 - 10x + 10 - (2x + 3)(2x - 5)}{(x^2 - 5x + 5)^2} = \frac{-2x^2 - 6x + 25}{(x^2 - 5x + 5)^2}$$

Esercizio 21.  $y = \frac{2}{2x-1} - \frac{1}{x}$ : possiamo prima sommare le due frazioni e poi derivare la frazione risultante:  $y = \frac{2x-2x+1}{x(2x-1)} = \frac{1}{2x^2-x}$ ; in questo caso la derivata del numeratore è nulla

$$y' = \frac{-4x+1}{x^2 (2x-1)^2}$$

Esercizio 22.  $y = \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$ : applichiamo la regola di derivazione di un rapporto di funzione e la derivata elementare relativa ad una radice quadrata

$$y' = \frac{\frac{1 - \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{1 + \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}}{(1 - \sqrt{x})^2} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{(1 - \sqrt{x})^2} = \frac{1}{\sqrt{x}(1 - \sqrt{x})^2}$$

# Funzioni trigonometriche e funzioni trigonometriche inverse

**Esercizio 23.**  $y = 5 \sin x + 3 \cos x$ : ricordiamo le derivate delle funzioni goniometriche,  $(\sin x)' = \cos x$  e  $(\cos x)' = -\sin x$ 

$$y^{'} = 5\cos x - 3\sin x$$

**Esercizio 24.**  $y = \tan x - \cot x$ : ricordiamo le derivate delle due funzioni,  $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$  e  $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$ 

$$y' = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x}$$

**Esercizio 25.**  $y = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$ : derivo applicando le derivate fondamentali e la regola di derivazione del rapporto  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2}$ 

$$y' = \frac{(\cos x - \sin x)(\sin x - \cos x) - (\cos x + \sin x)(\sin x + \cos x)}{(\sin x - \cos x)^2} = \frac{-(\cos x - \sin x)^2 - (\cos x + \sin x)^2}{(\sin x - \cos x)^2} = \frac{-2(\cos^2 x + \sin^2 x)}{(\sin x - \cos x)^2} = -\frac{2}{(\sin x - \cos x)^2}$$

**Esercizio 26.**  $y = 2x \sin x - (x^2 - 2) \cos x$ : oltre alle derivate fondamentali delle potenze e delle funzioni goniometriche, utilizzeremo anche la regola per la derivata di un prodotto: (f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x), [le parentesi non sono necessarie, ma servono per mostrare le varie parti in cui suddividiamo la derivazione]

$$y' = [(2)\sin x + 2x(\cos x)] - [(2x)\cos x + (x^2 - 2)(-\sin x)] =$$
  
=  $2\sin x + 2x\cos x - 2x\cos x + (x^2 - 2)\sin x = x^2\sin x$ 

Esercizio 27.  $y = x \cot x$ : basta applicare la regola della derivata di un prodotto

$$y' = (1) \cot x + x \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) = \frac{\sin x \cos x - x}{\sin^2 x}$$

**Esercizio 28.**  $y = x \arcsin x$ : come sopra

$$y' = (1) \arcsin x + x \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}\right) = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Esercizio 29.  $y = \frac{(1+x^2)\arctan x - x}{2}$ : anche in questo caso applichiamo le regole del prodotto e della somma; (questa non è una funzione fratta e non richiede la regola del quoziente)

$$y' = \frac{1}{2} \left[ (2x) \arctan x + (1+x^2) \left( \frac{1}{1+x^2} \right) - 1 \right] = x \arctan x$$

# Funzioni esponenziali e logaritmiche

**Esercizio 30.**  $y = x^7 e^x$ : ricordiamo che la derivata di  $(e^x)' = e^x$  e applicando la regola del prodotto, si ha

$$y' = (7x^{6}) e^{x} + x^{7}e^{x} = x^{6}e^{x} (7+x)$$

**Esercizio 31.**  $y = (x - 1) e^x$ : deriviamo applicando la regola del prodotto, sapendo che (x - 1)' = 1

$$y' = 1e^x + (x - 1)e^x = xe^x$$

**Esercizio 32.**  $y=\frac{e^x}{x^2}$ : deriviamo applicando la regola del quoziente,  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'=\frac{f^{'}(x)g(x)-g^{'}(x)f(x)}{(g(x))^2}$ , sapendo che  $\left(x^2\right)'=2x$ 

$$y' = \frac{e^x x^2 - 2xe^x}{x^4} = \frac{xe^x (x-2)}{x^4} = \frac{e^x (x-2)}{x^3}$$

Esercizio 33.  $y=e^x\cos x$ : applichiamo la regola del prodotto, ricordando che  $(\cos x)'=-\sin x$ 

$$y' = e^x \cos x + e^x (-\sin x) = e^x (\cos x - \sin x)$$

**Esercizio 34.**  $y = (x^2 - 2x + 2) e^x$ : applichiamo la regola del prodotto

$$y' = (2x - 2)e^{x} + (x^{2} - 2x + 2)e^{x} = x^{2}e^{x}$$

**Esercizio 35.**  $y = e^x \arcsin x$ : ricordiamo che  $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 

$$y' = e^x \arcsin x + \frac{e^x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

**Esercizio 36.**  $y = \frac{x^2}{\ln x}$ : applichiamo la regola del prodotto, ricordando che  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ 

$$y' = \frac{(2x)\ln x - x^2 \cdot \frac{1}{x}}{\ln^2 x} = \frac{x(2\ln x - 1)}{\ln^2 x}$$

**Esercizio 37.**  $y = x^3 \ln x - \frac{x^3}{3}$ : regole del prodotto e della somma

$$y' = (3x^2) \ln x + \frac{x^3}{x} - \frac{3x^2}{3} = 3x^2 \ln x$$

**Esercizio 38.**  $y = \frac{1}{x} + 2 \ln x - \frac{\ln x}{x}$ : regola della quoziente e della somma

$$y^{'} = -\frac{1}{x^{2}} + \frac{2}{x} - \frac{\frac{1}{x} \cdot x - 1 \ln x}{x^{2}} = \frac{-1 + 2x - 1 + \ln x}{x^{2}} = \frac{2x - 2 + \ln x}{x^{2}}$$

**Esercizio 39.**  $y = \ln x \log x - \ln a \log_a x$ : regola del prodotto e della somma, ricordando che  $(\log_a x)' = \frac{\log_a e}{x}$ ;  $\log x$  rappresenta  $\log_a$  con a = 10, mentre  $\ln a$  è una costante

$$y' = \frac{1}{x} \log x + \ln x \frac{\log e}{x} - \ln a \frac{\log_a e}{x} = \frac{1}{x} \left( \frac{\ln x}{\ln 10} + \ln x \frac{\ln e}{\ln 10} - \ln e \right)$$

# **Funzioni Composte**

**Esercizio 40.**  $y = (1 + 3x - 5x^2)^{30}$ : il polinomio  $(1 + 3x - 5x^2)$  rappresenta la base della potenza con esponente 30. Deriveremo pertanto come una potenza; essendo però la base una funzione di x, dovremo moltiplicare anche per la derivata di tale polinomio

$$y' = 30 (1 + 3x - 5x^2)^{29} \cdot (3 - 10x)$$

Esercizio 41.  $y = \left(\frac{ax+b}{c}\right)^3$ : una funzione polinomiale come base di una potenza, si procede come nel precedente esercizio

$$y' = 3\left(\frac{ax+b}{c}\right)^{2} \cdot \left(\frac{a}{c}\right)$$

**Esercizio 42.**  $y = (3 + 2x^2)^4$ : come i due esercizi precedenti

$$y' = 4(3 + 2x^2)^3 \cdot (4x) = 16x(3 + 2x^2)^3$$

•  $y = \frac{3}{56(2x-1)^7}$ : in questo caso il polinomio base di una potenza è il denominatore della frazione e ciò richiede l'utilizzo anche della regola del quoziente  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2}$ 

$$y' = \frac{3}{56} \cdot \frac{-7(2x-1)^6(2)}{(2x-1)^{14}} = -\frac{3}{4(2x-1)^8}$$

**Esercizio 43.**  $y = \sqrt{1-x^2}$ : radice con radicando funzione di x

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

**Esercizio 44.**  $y = \sqrt[3]{a + bx^3}$ : riscriviamo prima la radice cubica come potenza ad esponente frazionario  $y = (a + bx^3)^{\frac{1}{3}}$  e deriviamo secondo la regola delle potenze

$$y' = \frac{1}{3} (a + bx^3)^{-\frac{2}{3}} (3bx^2) = bx^2 (a + bx^3)^{-\frac{2}{3}} = bx^2 \sqrt[3]{(a + bx^3)^2}$$

**Esercizio 45.**  $y = (3 - 2\sin x)^5$ : sempre come potenza per la derivata del polinomio base

$$y' = 5(3 - 2\sin x)^{4}(-2\cos x) = -10\cos x(3 - 2\sin x)^{4}$$

Esercizio 46.  $y = \tan x - \frac{1}{3} \tan^3 x + \frac{1}{5} \tan^5 x$ : si può considerare come un polinomio in  $\tan x$  e derivare secondo le modalità delle funzioni polinomiali, tenendo conto che  $\tan x$  è appunto a sua volta una funzione di x, e che la sua derivata è data da  $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ 

$$y' = \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3\tan^2 x}{\cos^2 x} + \frac{1}{5} \cdot \frac{5\tan^4 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \left(1 - \tan^2 x + \tan^4 x\right)$$

Esercizio 47.  $y = \sqrt{\cot x} - \sqrt{\cot \alpha}$ : qui si tratta di ricordare le due derivate fondamentali della cotangente  $-\frac{1}{\sin^2 x}$  e della radice quadrata  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ ; la cot  $\alpha$  si deve considerare come una costante

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\cot x}} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)$$

**Esercizio 48.**  $y = 2x + 5\cos^3 x$ :

$$y' = 2 + 5(3\cos^2 x)(-\sin x) = 2 - 15\sin x \cos^2 x$$

Esercizio 49.  $y = -\frac{1}{6(1-3\cos x)^2}$ : può essere riscritta come  $y = -\frac{1}{6}(1-3\cos x)^{-2}$  e quindi derivata come una potenza la cui base contiene la funzione coseno

$$y' = -\frac{1}{6} \cdot \left[ -2\left(1 - 3\cos x\right)^{-3} \right] \cdot \left(-3\sin x\right) = -\sin x \left(1 - 3\cos x\right)^{-3} = \frac{\sin x}{\left(1 - 3\cos x\right)^{3}}$$

Esercizio 50.  $y = \frac{1}{3\cos^3 x} - \frac{1}{\cos x}$ : si può derivare come una funzione quoziente  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2}$ 

$$y' = \frac{-(9\cos^{2}x)(-\sin x)}{9\cos^{6}x} - \frac{-\sin x}{\cos^{2}x}$$
$$= \frac{\sin x}{\cos^{4}x} + \frac{\sin x}{\cos^{2}x} = \frac{\sin x}{\cos^{2}x} \left(\frac{1}{\cos^{2}x} + 1\right)$$

Esercizio 51.  $y = \sqrt{\frac{3 \sin x - 2 \cos x}{5}}$ : richiede la derivazione del radicale, moltiplicata per la derivata del radicando (polinomio composto da funzioni goniometriche), cioè  $\sqrt{f(x)} = \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x)$ 

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\frac{3\sin x - 2\cos x}{5}}} \cdot \left(\frac{3\cos x + 2\sin x}{5}\right)$$

**Esercizio 52.**  $y = \sqrt[3]{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^3 x}$ : applichiamo la derivata di una somma che è uguale alla somma delle derivate; il primo addendo si può derivare trasformandolo come  $\sin^{\frac{2}{3}} x$ , e il secondo come  $\cos^{-3} x$ 

$$y' = \frac{2}{3}\sin^{-\frac{1}{3}} \cdot (2\sin x \cos x) - 3\cos^{-4} x \cdot (-\sin x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{\sin x}} + \frac{3\sin x}{\cos^4 x}$$

Esercizio 53.  $y = \frac{1}{\arctan x}$ : basta riscriverla come  $\arctan^{-1} x$ 

$$y' = -\arctan^{-2}x \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

Esercizio 54.  $y = \sqrt{xe^x + x}$ : deriviamo il radicale quadrato e lo moltiplichiamo per la derivata del radicando, che contiene un prodotto di funzioni  $(xe^x)$ ,  $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$ 

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{xe^x + x}} \cdot (e^x + xe^x + 1)$$

**Esercizio 55.**  $y = \sqrt{2e^x - 2^x + 1} + \ln^5 x$ : deriviamo separatamente i due addendi; in questo caso ricordiamo le derivate dei due esponenziali, cioè  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ , mentre  $(2^x)' = 2^x \ln 2$ 

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{2e^x - 2^x + 1}} \cdot (2e^x - 2^x \ln 2) + 5\ln^4 x \cdot \frac{1}{x}$$

**Esercizio 56.**  $y = \sin 3x + \cos \frac{x}{5} + \tan \sqrt{x}$ : basta applicare le derivate delle funzioni logaritmiche

$$y' = \cos 3x \cdot 3 - \sin \frac{x}{5} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{\cos^2 \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

**Esercizio 57.**  $y = \sin(x^2 - 5x + 1) + \tan\frac{a}{x}$ : si derivano le funzioni goniometriche moltiplicando poi per la derivata dei rispettivi argomenti, che sono funzioni dell'incognita x

$$y' = \cos(x^2 - 5x + 1) \cdot (2x - 5) + \frac{1}{\cos^2\frac{a}{x}} \cdot \left(-\frac{a}{x^2}\right)$$

**Esercizio 58.**  $y = \arcsin \frac{1}{x^2}$ : come per l'esercizio precedente, ricordando che la derivata dell'arcoseno è  $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ , per cui

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^4}}} \cdot \left(\frac{-2x}{x^4}\right) = \frac{-2}{x\sqrt{x^4 - 1}}$$

Esercizio 59.  $y = 5e^{-x^2}$ : derivata della funzione esponenziale moltiplicata per la derivata dell'esponente

$$y' = 5e^{-x^2} \cdot (-2x) = -10xe^{-x^2}$$

**Esercizio 60.**  $y = \ln(2x + 7)$ :

$$y' = \frac{1}{2x+7} \cdot (2) = \frac{2}{2x+7}$$

Esercizio 61.  $y = \ln \sin x$ : l'argomento del logaritmo è una funzione goniometrica di x; deriviamo prima il logaritmo moltiplicando poi la derivata del seno

$$y' = \frac{1}{\sin x} \cdot (\cos x) = \cot x$$

Esercizio 62.  $y = \frac{x^8}{8(1-x^2)^4}$ : la funzione è fratta e quindi va applicata la regola del quoziente, all'interno della quale, la derivata del denominatore richiede la derivazione di una funzione composta

$$y' = \frac{(8x^7) 8 (1 - x^2)^4 - [32 (1 - x^2)^3 (-2x)] x^8}{64 (1 - x^2)^8} =$$

$$= \frac{64x^7 (1 - x^2)^4 + 64x^9 (1 - x^2)^3}{64 (1 - x^2)^8} = \frac{64x^7 (1 - x^2)^3 [1 - x^2 + x^2]}{64 (1 - x^2)^8} =$$

$$= \frac{x^7 (1 - x^2)^3}{(1 - x^2)^8} = \frac{x^7}{(1 - x^2)^5}$$

Esercizio 63.  $y = \frac{\sqrt{2x^2 - 2x + 1}}{x}$ : il secondo membro presenta una frazione con numeratore irrazionale; si deriva la frazione, secondo la regola del quoziente  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2}$ ; la derivata del numeratore sarà data dalla derivata della radice  $\frac{1}{2\sqrt{f(x)}}$  per la derivata del radicando, f'(x)

$$\begin{array}{rcl} y^{'} & = & \frac{\frac{1}{2\sqrt{2x^{2}-2x+1}}\cdot(4x-2)\cdot x-1\cdot\sqrt{2x^{2}-2x+1}}{x^{2}} \\ & = & \frac{\frac{4x^{2}-2x}{2\sqrt{2x^{2}-2x+1}}-\sqrt{2x^{2}-2x+1}}{x^{2}} = \frac{4x^{2}-2x-4x^{2}+4x-2}{x^{2}\sqrt{2x^{2}-2x+1}} \\ & = & \frac{x-1}{x^{2}\sqrt{2x^{2}-2x+1}} \end{array}$$

**Esercizio 64.**  $y = (a + x) \sqrt{a - x}$ : la derivata di un prodotto, (f(x) g(x))' = f'(x) g(x) + f(x) g'(x), il secondo fattore andrà derivata come i radicali di indice due:

$$y' = (1)\sqrt{a-x} + (a+x)\frac{1}{2\sqrt{a-x}} \cdot (-1) = \frac{2a-2x-a-x}{2\sqrt{a-x}} = \frac{a-3x}{2\sqrt{a-x}}$$

**Esercizio 65.**  $y = \sqrt[3]{x + \sqrt{x}}$ : scriviamo la radice cubica sotto forma di potenza,  $(x + \sqrt{x})^{\frac{1}{3}}$ , deriviamo la potenza moltiplicando per la derivata della base che contiene anche un radicale

$$y' = \frac{1}{3} (x + \sqrt{x})^{-\frac{2}{3}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$$

**Esercizio 66.**  $y = \ln(\sqrt{1+e^x}-1)$ : dobbiamo derivare la funzione logaritmica e moltiplicare per la derivata del suo argomento

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 + e^x} - 1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1 + e^x}} \cdot (e^x) = \frac{e^x}{2\sqrt{1 + e^x} \left(\sqrt{1 + e^x} - 1\right)}$$

Esercizio 67.  $y = \tan^5 5x$ : deriviamo la potenza, moltiplicando per la derivata della tangente e per la derivata del suo argomento

$$y' = 5 \tan^4 5x \cdot \frac{1}{\cos^2 5x} \cdot 5 = 25 \sec^2 5x \tan^4 5x$$

**Esercizio 68.**  $y = \sin^2(x^3)$ : deriviamo la potenza, moltiplicando poi per la derivata della funzione goniometrica per la derivata del suo argomento

$$y' = 2\sin(x^3) \cdot \cos(x^3) \cdot (3x^2) = 3x^2\sin(2x^3)$$

Esercizio 69.  $y = \arcsin \frac{x^2 - 1}{x^2}$ : deriviamo prima la funzione arcoseno, moltiplicando poi per la derivata dell'argomento, una funzione polinomiale fratta

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x^2 - 1}{x^2}\right)^2}} \cdot \left(\frac{2x\left(x^2\right) - 2x\left(x^2 - 1\right)}{x^4}\right) = \frac{2x}{x^4\sqrt{1 - \left(\frac{x^2 - 1}{x^2}\right)^2}} = \frac{2}{x^3\sqrt{\frac{x^4 - x^4 + 2x^2 - 1}{x^4}}} = \frac{2}{x\sqrt{2x^2 - 1}}$$

Esercizio 70.  $y = \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}$ : applichiamo la regola di derivazione del quoziente di due funzioni; il denominatore è a sua volta funzione di x

$$y^{'} = \frac{-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \left(\sqrt{1-x^2}\right) - \frac{(-2x)}{2\sqrt{1-x^2}} \arccos x}{1-x^2} = \frac{\frac{-2\sqrt{1-x^2}+2x\arccos x}}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{-\sqrt{1-x^2}+x\arccos x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

Esercizio 71.  $y = \ln(\arcsin 5x)$ : deriviamo la funzione logaritmo, moltiplicando per la derivata del suo argomento e per la derivata dell'argomento dell'arcoseno

$$y' = \frac{1}{\arcsin 5x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - 25x^2}} \cdot 5$$

Esercizio 72.  $y = \arcsin(\ln x)$ : deriviamo la funzione arcoseno, moltiplicando per la derivata del suo argomento

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \ln^2 x}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x\sqrt{1 - \ln^2 x}}$$

Esercizio 73.  $y = \arctan \frac{x \sin \alpha}{1 - x \cos \alpha}$ : deriviamo la funzione arcotangente, moltiplicando poi per la derivata del suo argomento (la variabile è x, e quindi la derivata è rispetto ad x)

$$y' = \frac{1}{1 + \left(\frac{x \sin \alpha}{1 - x \cos \alpha}\right)^2} \cdot \frac{\sin \alpha \left(1 - x \cos \alpha\right) + \cos \alpha \left(x \sin \alpha\right)}{\left(1 - x \cos \alpha\right)^2}$$
$$= \frac{\sin \alpha - x \sin \alpha \cos \alpha + x \sin \alpha \cos \alpha}{\left(1 - x \cos \alpha\right)^2 \left(\frac{1 + x^2 \cos^2 \alpha - 2x \cos \alpha + x^2 \sin^2 \alpha}{\left(1 - x \cos \alpha\right)^2}\right)} = \frac{\sin \alpha}{1 + x^2 - 2x \cos \alpha}$$

Esercizio 74.  $y = \sqrt{\cos x} a^{\sqrt{\cos x}}$ : applichiamo la regola della derivata del prodotto di due funzioni (un radicale e un esponenziale) tenendo conto che tali funzioni sono a loro volta funzioni della variabile x

$$y^{'} = \frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}} \left(a^{\sqrt{\cos x}}\right) + \sqrt{\cos x} \left(a^{\sqrt{\cos x}} \ln a\right) \left(\frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}}\right) = \frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}} a^{\sqrt{\cos x}} \left(1 + \ln a\sqrt{\cos x}\right)$$

Esercizio 75.  $y = \ln \cos \frac{x-1}{x}$ : deriviamo prima la funzione logaritmo, moltiplicando poi per la derivata del suo argomento e per la derivata dell'argomento della funzione coseno, che è una funzione polinomiale fratta

$$y' = \frac{1}{\cos\frac{x-1}{x}} \cdot \left(-\sin\frac{x-1}{x}\right) \left(\frac{x-x+1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x^2} \tan\frac{x-1}{x}$$

**Esercizio 76.**  $y = \ln \frac{(x-2)^5}{(x+1)^3}$ : applichiamo prima le proprietà dei logaritmi,  $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$ , e  $\ln a^n = n \ln a$ , ottenendo

$$y = 5 \ln(x-2) - 3 \ln(x+1)$$

da cui, derivando le funzioni logaritmo, si ha

$$y' = \frac{5}{x-2} - \frac{3}{x+1} = \frac{5x+5-3x+6}{(x-2)(x+1)} = \frac{2x+11}{(x-2)(x+1)}$$

**Esercizio 77.**  $y = x \cdot \sin\left(\ln x - \frac{\pi}{4}\right)$ : applichiamo la regola di derivazione del prodotto di due funzioni

$$y^{'} = 1 \cdot \sin\left(\ln x - \frac{\pi}{4}\right) + x\cos\left(\ln x - \frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{1}{x}\right) = \sin\left(\ln x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\ln x - \frac{\pi}{4}\right)$$

ricordando le formule della goniometria può essere riscritta

$$y' = \sqrt{2}\sin\left(\ln x\right)$$

**Esercizio 78.** Calcolare y' se y = |x| o se y = x |x|

• caso y = |x|: ricordando il significato del valore assoluto,

$$\begin{array}{lll} se \ y>0 & y=x & y^{'}=1 \\ se \ y<0 & y=-x & y=-1 \\ se \ y=0 & y=0 & y^{'} \ non \ esiste \end{array}$$

• caso  $y = x \mid x \mid$ 

$$\begin{array}{lll} se \ y > 0 & y = x^2 & y^{'} = 2x \\ se \ y < 0 & y = -x^2 & y^{'} = -2x \\ se \ y = 0 & y = 0 & y^{'} \ non \ esiste \end{array}$$

**Esercizio 79.** Calcolare f'(x) se

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & per & x \le 0 \\ e^{-x} & per & x > 0 \end{cases}$$

17

Soluzione

$$f(x) = \begin{cases} -1 & per \ x \le 0 \\ -e^{-x} & per \ x > 0 \end{cases}$$

**Esercizio 80.** Calcolare f'(0) se  $f(x) = e^{-x} \cos 3x$ 

**Soluzione.** Si chiede di calcolare la derivata della funzione nel punto indicato; ciò si ottiene calcolando la derivata e operando la sostituzione x=0

$$f'(x) = -e^{-x}\cos 3x + e^{-x}(-3\sin 3x) = -e^{-x}(\cos 3x + 3\sin 3x)$$

sostituendo x = 0, si ha

$$f'(0) = -e^{0}(\cos 0 + 3\sin 0) = -1(1+0) = -1$$

**Esercizio 81.** Per la funzione data  $f(x) = e^{-x}$  calcolare l'espressione f(0) + xf'(0).

Soluzione. calcoliamo  $f(0) = e^0 = 1$ ; calcoliamo poi la derivata nel punto x = 0

$$f'(0) = -e^{-x} = -e^0 = -1$$

pertanto

$$f(0) + xf'(0) = 1 - x$$

**Esercizio 82.** Per le funzioni date f(x) = 1 - x e  $g(x) = 1 - \sin \frac{\pi x}{2}$ , calcolare l'espressione  $\frac{g'(1)}{f'(1)}$ 

Soluzione. Calcoliamo le derivate delle due funzioni

$$f'(x) = -1$$

$$g'(x) = -\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi x}{2}$$

calcoliamo ora le derivate nel punto x = 1

$$f'(1) = -1$$
  
 $g'(1) = 0$ 

il loro rapporto sarà

$$\frac{g'(x)}{f'(x)} = 0$$

Esercizio 83. Dimostrare che la derivata di una funzione pari è una funzione dispari e che la derivata di una funzione dispari è una funzione pari.

Soluzione. Una funzione è pari se

$$f(x) = f(-x)$$

calcoliamo la derivata

$$[f(x)]' = f'(x)$$
$$[f(-x)]' = -f'(x)$$

dando quindi una funzione dispari. Analogamente, una funzione è detta dispari se

$$f\left(-x\right) = -f\left(x\right)$$

derivando si ha

$$[f(-x)]' = -f'(x)$$
$$[-f(x)]' = -f'(x)$$

cioè la stessa derivata, con la conseguenza richiesta.

Esercizio 84. Mostrare che la funzione

$$y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$$

soddisfa l'equazione

$$xy' = (1 - x^2) y$$

Soluzione. deriviamo la funzione y

$$y' = e^{-\frac{x^2}{2}} + xe^{-\frac{x^2}{2}}(-x)$$

e sostituiamo

$$x\left(e^{-\frac{x^2}{2}} - x^2e^{-\frac{x^2}{2}}\right) = (1 - x^2)xe^{-\frac{x^2}{2}}$$

svolgendo le moltiplicazioni in entrambi i membri, si ha

$$xe^{-\frac{x^2}{2}} - x^3e^{-\frac{x^2}{2}} = xe^{-\frac{x^2}{2}} - x^3e^{-\frac{x^2}{2}}$$

#### Esercizi riassuntivi

L'intelligenza artificiale è utile utilizzarla in casi di necessità, ma per questi esercizi l'intelligenza umana è più che sufficiente e a volte quella artificiale, per lo meno con accesso gratuito, sbaglia i conti.

**Esercizio 85.**  $y = \sqrt[3]{27 + x}$  riscriviamo sotto forma di potenza

$$y = (27 + x)^{\frac{1}{3}}$$

deriviamo la funzione potenza moltiplicando poi la derivata della sua base

$$y' = \frac{1}{3} (27 + x)^{-\frac{2}{3}} \cdot 1 = \frac{1}{3\sqrt[3]{(27 + x)^2}}$$

19

**Esercizio 86.**  $y = 4 + 5x + \ln x$  applichiamo il teorema della somma delle derivate

$$y' = 0 + 5 + \frac{1}{x} = \frac{5x+1}{x}$$

Esercizio 87.  $y=\frac{1}{x}-\frac{4}{x^2}+\sqrt{x}-5\sqrt[3]{x^2}$ riscriviamo tutti gli addendi sotto forma di potenza

$$y = x^{-1} - 4x^{-2} + x^{\frac{1}{2}} - 5x^{\frac{2}{3}}$$

applichiamo il teorema delle potenze e della somma di derivate

$$y' = -x^{-2} - 4 \cdot (-2) x^{-3} + \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} - 5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right) x^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{x^2} + \frac{8}{x^3} + \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{10}{3\sqrt[3]{x}}$$

Esercizio 88.  $y = \frac{x^4 + 4x}{\sqrt{x}}$  applichiamo il teorema del quoziente di due funzioni

$$y' = \frac{\left(4x^3 + 4\right)\sqrt{x} - \frac{x^4 + 4x}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{2x\left(4x^3 + 4\right) - x^4 - 4x}{2x\sqrt{x}} = \frac{7x^4 + 4x}{2x\sqrt{x}} = \frac{7x^3 + 4}{2\sqrt{x}}$$

**Esercizio 89.**  $y = \frac{1}{2}x^4 - 3^x \log_3 e$  applichiamo le derivate fondamentali e il teorema della somma

$$y' = 4 \cdot \frac{1}{2}x^3 - 3^x \ln 3 \cdot \frac{\ln e}{\ln 3} = 2x^3 - 3^x$$

ricordando la formula di cambio della base di un logaritmo e che  $\ln e = 1$  perché il logaritmo naturale ha base e.

**Esercizio 90.**  $y = x^2 (1-x) (1-4x)$  invece di moltiplicare applichiamo la derivata del prodotto

$$y' = 2x(1-x)(1-4x) - x^{2}(1-4x) - 4x^{2}(1-x)$$

raccogliamo

$$y' = 2x(1-x)(1-6x) - x^2 + 4x^3 = 16x^3 - 15x^2 + 2x = x(16x^2 - 15x + 2)$$

se invece moltiplichiamo subito i fattori avremo

$$y = x^{2} (1 - x) (1 - 4x) = 4x^{4} - 5x^{3} + x^{2}$$

da cui

$$y' = 16x^3 - 15x^2 + 2x = x(16x^2 - 15x + 2)$$

ognuno scelga la procedura preferita.

**Esercizio 91.**  $y = x^3 \sin x \ln x$ , applichiamo il prodotto delle derivate

$$y' = 3x^{2} \sin x \ln x + x^{3} \cos x \ln x + \frac{x^{3} \sin x}{x} = y' = 3x^{2} \sin x \ln x + x^{3} \cos x \ln x + x^{2} \sin x$$

Esercizio 92.  $y = (x-1) \ln^3 x$  applichiamo il prodotto di derivate e le potenze di una funzione

$$y' = 1 \cdot \ln^3 x + (x - 1) \cdot 3 \cdot \ln^2 x \cdot \frac{1}{x} = \frac{x \ln^3 x + 3(x - 1) \ln^2 x}{x}$$

**Esercizio 93.**  $y = x^2 + 2 + \frac{x^3}{4-x}$  applichiamo le derivate fondamentali e il th. del quoziente

$$y' = 2x + \frac{3x^{2}(4-x) + x^{3}}{(4-x)^{2}} = 2x + \frac{2x^{2}(6-x)}{(4-x)^{2}} = \frac{2x(16-8x+x) + 12x^{2} - 2x^{3}}{(4-x)^{2}} = \frac{4(8-x^{2})}{(4-x)^{2}}$$

 $y = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$  derivata di un quoziente

$$y' = \frac{\frac{x+1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x}}{(x+1)^2} = \frac{\frac{x+1-2x}{2\sqrt{x}}}{(x+1)^2} = \frac{1-x}{2\sqrt{x}(x+1)^2}$$

**Esercizio 94.**  $y = \frac{\sin x}{x + \cos x}$  derivata di un quoziente di due funzioni trascendenti

$$y' = \frac{\cos x (x + \cos x) - \sin x (1 - \sin x)}{(x + \cos x)^2} = \frac{x \cos x + \cos^2 x - \sin x + \sin^2 x}{(x + \cos x)^2} = \frac{1 + x \cos x - \sin x}{(x + \cos x)^2}$$

ricordando la proprietà fondamentale della goniometria.

**Esercizio 95.**  $y = \frac{\sin^2 x + 1}{\cos x}$  derivata di un quoziente di due funzioni trascendenti

$$y' = \frac{2\sin x \cos^2 x - \sin^3 x + \sin x}{\cos^2 x} = \frac{\sin x \left(2\cos^2 x - \sin^2 x + 1\right)}{\cos^2 x} = \frac{3\sin x \cos^2 x}{\cos^2 x} = 3\sin x$$

**Esercizio 96.**  $y = \sqrt[3]{\frac{\sin x}{\ln x}}$  si può riscrivere anche come  $y = \left(\frac{\sin x}{\ln x}\right)^{\frac{1}{3}}$  per cui

$$y' = \frac{1}{3} \left( \frac{\sin x}{\ln x} \right)^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{\cos x \cdot \ln x - \frac{\sin x}{x}}{\ln^2 x} = \frac{1}{3\sqrt[3]{\frac{\sin^2 x}{\ln^2 x}}} \left( \frac{\sin x}{\ln x} \right)^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{x \cos x \cdot \ln x - \sin x}{x \ln^2 x} = \frac{x \cos x \cdot \ln x - \sin x}{3x \ln^3 x \sqrt[3]{\sin^2 \ln x}}$$

Esercizio 97.  $y = \cos(x^2 + 4x)$ , funzione composta, per cui derivata del coseno per la derivata del suo argomento

$$y' = -\sin(x^2 + 4x) \cdot (2x + 4) = -2\sin(x^2 + 4x) \cdot (x + 2)$$

**Esercizio 98.**  $y = \ln(\ln x)$ , funzione composta, per cui derivata del logaritmo per la derivata del suo argomento

$$y' = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln x}$$

**Esercizio 99.**  $y = \ln\left(\frac{x^2+1}{\sqrt{x}}\right)$ , funzione composta, per cui derivata del logaritmo per la derivata del suo argomento

$$y' = \frac{1}{\frac{x^2 + 1}{\sqrt{x}}} \cdot \frac{2x\sqrt{x} - \frac{x^2 + 1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1} \cdot \frac{4x^2 - x^2 - 1}{2x\sqrt{x}} = \frac{3x^2 - 1}{2x(x^2 + 1)}$$

**Esercizio 100.**  $y = \ln(e^x - 2)$ 

$$y' = \frac{e^x}{e^x - 2}$$

**Esercizio 101.**  $y = \ln\left(\tan\frac{x}{2}\right)$ , in questo caso la derivata del logaritmo per la derivata della tangente per la derivata dell'argomento della tangente

$$y' = \frac{1}{\tan\frac{x}{2}} \cdot \left(1 + \tan^2\frac{x}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1 + \tan^2\frac{x}{2}}{2\tan\frac{x}{2}} = \frac{\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}}{2\frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}}} = \frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} = \frac{1}{\sin x}$$

applicando la formula di duplicazione del seno.

Esercizio 102.  $y = e^{\sin x} (\cos x + \sin x)$ 

$$y' = e^{\sin x} \cdot \cos x \left(\cos x + \sin x\right) + e^{\sin x} \left(-\sin x + \cos x\right) = e^{\sin x} \left(\cos^2 x + \sin x \cos x - \sin x + \cos x\right)$$

Esercizio 103. 
$$y = \frac{\sqrt{1 + \sin 2x}}{\tan x}$$

$$y' = \frac{\frac{2\cos 2x}{2\sqrt{1+\sin 2x}} \cdot \tan x - (1+\tan^2 x) \cdot \sqrt{1+\sin 2x}}{\tan^2 x} = \frac{\cos 2x \tan x - (1+\sin 2x) (1+\tan^2 x)}{\tan^2 x \sqrt{1+\sin 2x}}$$

Esercizio 104.  $y = \sqrt{\frac{e^x}{e^x + 1}}$ 

$$y' = \frac{\frac{e^x (e^x + 1) - e^{2x}}{(e^x + 1)^2}}{2\sqrt{\frac{e^x}{e^x + 1}}} = \frac{e^x}{2(e^x + 1)^2 \sqrt{\frac{e^x}{e^x + 1}}}$$

razionalizzando

$$= \frac{e^{x} \cdot \sqrt{\frac{e^{x}}{e^{x} + 1}}}{2(e^{x} + 1)^{2} \sqrt{\frac{e^{x}}{e^{x} + 1}} \cdot \sqrt{\frac{e^{x}}{e^{x} + 1}}} = \frac{e^{x} \cdot \sqrt{\frac{e^{x}}{e^{x} + 1}}}{2(e^{x} + 1)^{2} e^{x} \cdot \frac{e^{x}}{e^{x} + 1}} = \frac{\sqrt{e^{x}}}{2e^{x} (e^{x} + 1) \sqrt{e^{x} + 1}}$$

Derivate di funzioni della forma  $D\left[f\left(x\right)^{g(x)}\right]=\left[f\left(x\right)\right]^{g(x)}\left[g'\left(x\right)\ln f\left(x\right)+g\left(x\right)\frac{f'\left(x\right)}{f\left(x\right)}\right]$  mediante l'osservazione che  $\left[f\left(x\right)\right]^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}$ 

Esercizio 105.  $y = x^x$  base ed esponente sono rappresentati dall'incognita.

$$y' = x^x \left[ \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right] = x^x \left( \ln x + 1 \right)$$

Esercizio 106.  $y = (\cos x)^{\sin x}$ 

$$y' = (\cos x)^{\sin x} \left[ \cos x \ln \cos x + \sin x \cdot \frac{-\sin x}{\cos x} \right] = (\cos x)^{\sin x} \left( \cos x \ln \cos x - \frac{\sin^2 x}{\cos x} \right)$$

**Esercizio 107.**  $y = \left(\frac{x}{x+1}\right)^{x^2-2}$ , dove  $f(x) = \frac{x}{x+1} \in g(x) = x^2 - 2$ 

$$y' = \left(\frac{x}{x+1}\right)^{x^2-2} \left[ 2x \ln \frac{x}{x+1} + \left(x^2 - 2\right) \frac{\frac{x+1-x}{(x+1)^2}}{\frac{x}{x+1}} \right] = \left(\frac{x}{x+1}\right)^{x^2-2} \left[ 2x \ln \frac{x}{x+1} + \frac{x^2-2}{x(x+1)} \right]$$

#### **Derivate successive**

Esercizio 108. Calcola le derivate successive fino al terzo ordine della funzione  $y = x^3 - 3x^2$ .

$$y' = 3x^2 - 6x$$
  $y'' = 6x - 6$   $y''' = 6$ 

**Esercizio 109.** Calcola le derivate successive fino al terzo ordine della funzione  $y = \tan x - x$ .

$$y' = \tan^2 x$$
  $y'' = \frac{2\sin x}{\cos^3 x}$   $y''' = \frac{2\cos^2 x + 6\sin^2 x}{\cos^4 x} = \frac{2 + 4\sin^2 x}{\cos^4 x}$ 

**Esercizio 110.** Calcola le derivate successive fino al terzo ordine della funzione  $y = x \ln x$ .

$$y' = \ln x + 1$$
  $y'' = \frac{1}{x}$   $y''' = -\frac{1}{x^2}$ 

**Esercizio 111.** Calcola le derivate successive fino al terzo ordine della funzione  $y = \sqrt{x^2 + 1}$ .

$$y' = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$
  $y" = \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$   $y"' = -\frac{3x}{(x^2+1)^2\sqrt{x^2+1}}$ 

Esercizio 112. Verifica che la funzione  $y = 3e^x + 1$  soddisfa l'equazione 2y - y' - y'' = 2, dove y' e y'' sono rispettivamente la derivata prima e seconda della funzione.

$$y' = 3e^x \quad y" = 3e^x$$

per cui

$$6e^x + 2 - 3e^x - 3e^x = 2$$

Esercizio 113. Verifica che la funzione  $y = \sqrt{x^2 - 1}$  soddisfa l'equazione yy' = x, dove y' è la derivata prima della funzione.

$$y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

per cui

$$\frac{x\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{x^2 - 1}} = x$$

**Esercizio 114.** Verifica che la funzione  $y = \ln(x^2 + 1)$  soddisfa l'equazione  $y' + xy'' = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$ , dove y' e y'' sono rispettivamente la derivata prima e seconda della funzione.

$$y' = \frac{2x}{x^2+1}$$
  $y" = \frac{-2(x^2-1)}{(x^2+1)^2}$ 

per cui

$$\frac{2x}{x^2+1} + \frac{-2x^3+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2x^3+2x-2x^3+2x}{(x^2+1)} = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$$

**Esercizio 115.** Verifica che la funzione  $y = \cos 2x - \sin x$  soddisfa l'equazione  $y'' + 4y = -3\sin x$ , dove y'' è la derivata seconda della funzione.

$$y' = -2\sin 2x - \cos x$$
  $y'' = -4\cos 2x + \sin x$ 

per cui

$$-4\cos 2x + \sin x + 4\cos 2x - 4\sin x = -3\sin x$$

# Derivate di Funzioni non esplicite

### Derivata di una funzione inversa

Se la funzione  $y=f\left(x\right)$  ha una derivata  $y_{x}^{'}\neq0$ , allora la derivata della funzione inversa  $x=f^{-1}\left(y\right)$  è data da

 $x_{y}^{'} = \frac{1}{y^{'}(x)}$ 

Esempio 116. Calcolare la derivata  $\boldsymbol{x}_y'$  della funzione

$$y = x + \ln x$$

Calcoliamo la derivata di y rispetto ad x

$$y^{'} = 1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$$

Pertanto, la derivata di x, rispetto ad y, sarà

$$x' = \frac{1}{\frac{x+1}{x}} = \frac{x}{x+1}$$

Esercizio 117. Calcolare la derivata  $\boldsymbol{x}_{y}^{'},$  nei seguenti casi

•  $y = 3x + x^3$ : calcoliamo la derivata y'

$$y' = 3 + 3x^2$$

da cui,

$$x_{y}^{'} = \frac{1}{3 + 3x^{2}}$$

•  $y = x - \frac{1}{2}\sin x$ :

$$y^{'} = 1 - \frac{1}{2}\cos x$$

e

$$x_y' = \frac{2}{2 - \cos x}$$

•  $y = x + e^{\frac{x}{2}}$ :

$$y^{'} = 1 + \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$$

e quindi

$$x_{y}^{'} = \frac{2}{1 + e^{\frac{x}{2}}}$$

#### Derivata di una funzione implicita

Se la dipendenza tra le due variabili è espressa da una relazione del tipo

$$F\left( x,y\right) =0$$

allora, per calcolare la derivata di y rispetto ad x, basta, nei casi semplici,

- ullet calcolare la derivata rispetto ad x del primo membro dell'equazione, dove si considera y una funzione di x
- calcolare  $\frac{d}{dx}[F(x,y)] = 0$
- risolvere rispetto alla derivata di y, y'.

**Esempio 118.**  $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ : Calcoliamo la derivata

$$3x^{2} + 3y^{2}y' - 3a\left(y + xy'\right) = 0$$

risolvendo rispetto a y' si ottiene

$$y' = \frac{x^2 - ay}{ax - y^2}$$

# Applicazioni della derivata alla geometria e alla fisica

### Equazione della tangente a una curva

Ricordando l'interpretazione geometrica della derivata, segue che, assegnata una curva y = f(x), l'equazione della tangente alla curva in un punto  $P(x_0; y_0)$ è

$$y - y_0 = y_0'(x - x_0)$$

che, come si vede, è l'equazione della retta passante per un punto il cui coefficiente angolare è uguale alla derivata della funzione calcolata nel punto P; cioè

$$m = y_0' = \frac{dy}{dx} \mid_{x=x_0}$$

**Esercizio 119.** Scrivere l'equazione della tangente al grafico della funzione  $f(x) = 3x^2 - 9x + 4$  nel punto di ascissa  $x_0 = 1$ .

**Soluzione.** Troviamo innanzitutto le coordinate del punto  $x_0$ .

$$f(1) = 3 - 9 + 4 = -2$$

la retta tangente passa quindi dal punto (1; -2). Sappiamo poi che la derivata della funzione in quel punto è il coefficiente angolare della retta tangente.

$$y' = 6x - 9$$
  $y'(1) = -3$ 

la retta sarà quindi

$$y - (-2) = -3(x - 1)$$
  $y = -3x + 1$ 

Esercizio 120. Scrivere l'equazione della tangente al grafico della funzione  $f(x) = \frac{x+1}{x}$  nel punto  $x_0 = -1$ .

Soluzione. Coordinate del punto

$$f\left(-1\right) = 0$$

la retta tangente passa quindi dal punto (-1;0). Calcoliamo la derivata della funzione nel punto assegnato

$$y' = \frac{x - x - 1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$
  $y'(-1) = -1$ 

la retta sarà quindi

$$y - (0) = -1(x+1)$$
  $y = -x - 1$ 

Esercizio 121. Scrivere l'equazione della tangente al grafico della funzione  $f(x) = \sqrt{1-x^3}$  nel punto  $x_0 = 1$ .

Soluzione. Coordinate del punto

$$f(1) = 0$$

la retta tangente passa quindi dal punto (1;0). Calcoliamo la derivata della funzione nel punto assegnato

$$y' = \frac{-3x^2}{2\sqrt{1-x^3}}$$

osserviamo che x=1 non appartiene al dominio della funzione derivata; la tangente è quindi una retta perpendicolare all'asse x, cioè l'asintoto verticale della funzione derivata. La tangente sarà quindi x=1.

**Esercizio 122.** Scrivere l'equazione della tangente al grafico della funzione  $f(x) = \sin \frac{x}{2} + \cos 3x$  nel punto  $x_0 = \frac{\pi}{3}$ .

Soluzione. Calcoliamo le coordinate del punto di tangenza

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin\frac{\pi}{6} + \cos\pi = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

la retta è tangente nel punto  $\left(\frac{\pi}{3}; -\frac{1}{2}\right)$ . Calcoliamo la derivata nel punto dato

$$y' = \frac{1}{2}\cos\frac{x}{2} - 3\sin 3x$$
  $y'(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}\cos\frac{\pi}{6} - 3\sin\pi = \frac{\sqrt{3}}{4} - 0 = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 

l'equazione della retta tangente sarà

$$y + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left( x - \frac{\pi}{3} \right)$$

cioè

$$y = \frac{\sqrt{3}}{4}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{1}{2}$$

**Esercizio 123.** Scrivere l'equazione della tangente al grafico della funzione  $f(x) = \ln(3x + 2)$  nel punto  $x_0 = 0$ .

Soluzione. L'ordinata del punto di tangenza è

$$f(0) = \ln 2$$

e le coordinate di questo punto sono (0; ln 2). Calcoliamo la derivata nel punto di tangenza

$$y' = \frac{3}{3x+2}$$
  $y'(0) = \frac{3}{2}$ 

la retta ha quindi equazione

$$y - \ln 2 = \frac{3}{2}x$$
  $y = \frac{3}{2}x + \ln 2$ 

Esercizio 124. Trova le coordinate del punto della curva di equazione  $y = 3x^2 + 4$  in cui la retta tangente ha il coefficiente angolare m = 6

Soluzione. Se la retta ha coefficiente angolare 6, allora la derivata nel punto richiesto vale 6.

$$y' = 6x = 6$$
  $x = 1$ 

il punto ha quindi coordinate (1; 7).

**Esercizio 125.** Siano date le due funzioni  $f(x) = x^2 - 3x + 3$  e  $g(x) = x^3 - 11x + 15$ . Si risolva l'equazione f'(x) = g'(x) e sia la soluzione nell'intervallo [0;4], Spiega le deduzioni che si possono trarre.

Soluzione. Calcoliamo le due derivate ed eguagliamole

$$2x - 3 = 3x^2 - 11$$

l'equazione risultante è

$$3x^2 - 2x - 8 = 0$$

le soluzioni sono  $x_1 = -\frac{4}{3}$  e  $x_2 = 2$ . Consideriamo la soluzione x = 2 che appartiene all'intervallo assegnato. Le due funzioni avranno quindi una tangente comune di coefficiente angolare m = 2.

Esercizio 126. Data la curva di equazione  $y = x^3 - x^2 - x + 1$ , determinare le equazioni delle tangenti nei suoi punti di intersezione con gli assi cartesiani.

Soluzione. Calcoliamo le coordinate delle intersezioni con gli assi

$$\begin{cases} y = x^3 - x^2 - x + 1 \\ x = 0 \end{cases} \begin{cases} y = 1 \\ x = 0 \end{cases} P(0;1)$$

$$\begin{cases} y = x^3 - x^2 - x + 1 \\ y = 0 \end{cases} \begin{cases} (x - 1)^2 (x + 1) = 0 \\ y = 0 \end{cases} \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = 0 \end{cases} Q(-1;0) R(1;0)$$

Calcoliamo la derivata nei tre punti

$$y' = 3x^{2} - 2x - 1$$
  
 $y'(0) = -1$  retta  $y = -x + 1$   
 $y'(-1) = 4$  retta  $y = 4x + 4$   
 $y(1) = 0$  retta  $y = 0$ 

Esercizio 127. Siano A e B i punti di intersezione della parabola  $x = y^2 - 4y + 3$  con l'asse y. Dette  $t_1$  e  $t_2$  le tangenti ad essa in A e B, e C il loro punto di intersezione, trovare l'area del triangolo ABC.

Soluzione. Calcoliamo le coordinate dei punti di intersezione

$$\begin{cases} x = y^{2} - 4y + 3 \\ x = 0 \end{cases} \begin{cases} y = 1; 3 \\ x = 0 \end{cases} A(0; 1), B(0; 3)$$


Calcoliamo ora le equazioni delle rette tangenti alla parabola in tali punti

$$x' = 2y - 4$$
  $x'(1) = -2$   $t_1: y = -\frac{1}{2}x + 1 = 0$   
 $x' = 2y - 4$   $x'(3) = 2$   $t_1: y = \frac{1}{2}x + 3$ 

Troviamo ora l'intersezione tra le due rette

$$-\frac{1}{2}x + 1 = \frac{1}{2}x + 3$$
  $y = 1$   $C(2; -2)$ 

Il triangolo è mostrato in figura



Senza particolari calcoli, si vede che l'area del triangolo è

$$A_{ABC} = \frac{2 \times 2}{2} = 2$$

**Esercizio 128.** Determinare i parametri a, b affinché la curva di equazione  $y = \frac{ax+b}{x^2}$  passi per il punto (1;3) e abbia ivi per tangente la retta 4x + y - 7 = 0.

Soluzione. Due sono i parametri da determinare e due devono essere le relazioni indipendenti per ottenerli. Costruiamo quindi un sistema sostituendo alle due variabili le coordinate del punto e alla derivata nel punto il valore del coefficiente angolare della tangente. Il coefficiente angolare della retta è -4 e la derivata della funzione è

$$y' = \frac{ax^2 - 2ax^2 - 2bx}{x^4} = \frac{-2bx - ax^2}{x^4} = \frac{-2b - ax}{x^3} \quad x \neq 0$$

$$\begin{cases} 3 = \frac{a+b}{1} \\ \frac{-2b-a}{1^3} = -4 \end{cases} \begin{cases} a+b=3 \\ -a-2b=-4 \end{cases} \begin{cases} a=2 \\ b=1 \end{cases}$$

Esercizio 129. La tangente alla curva di equazione  $y = \frac{3 \tan x}{1 + \sin x}$  nel suo punto di ascissa  $\frac{\pi}{6}$  taglia l'asse x nel punto T. Trovare la distanza di T dall'origine.

Soluzione. Troviamo l'ordinata del punto di tangenza.

$$y = \frac{3\tan\frac{\pi}{6}}{1 + \sin\frac{\pi}{6}} = \frac{3 \times \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \qquad P\left(\frac{\pi}{6}; \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$$

Cerchiamo l'equazione della tangente nel punto P

$$y' = \frac{\frac{3(1+\sin x)}{\cos^2 x} - \frac{3\cos x \sin x}{\cos x}}{(1+\sin x)^2} = \frac{3+3\sin x - 3\sin x \cos^2 x}{\cos^2 x (1+\sin x)^2} = \frac{3(1+\sin^3 x)}{\cos^2 x (1+\sin x)^2}$$

la derivata puntuale è

$$y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\left(1 + \frac{1}{8}\right)}{\frac{3}{4}\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2} = 2$$

la retta tangente è

$$y - \frac{2\sqrt{3}}{3} = 2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$
  $y = 2x - \frac{\pi}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 

la retta interseca l'asse x nel punto

$$x = \frac{\frac{\pi}{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3}}{2} = \frac{\pi - 2\sqrt{3}}{6}$$

la distanza è

$$d = \left| 0 - \frac{\pi - 2\sqrt{3}}{6} \right| = \frac{2\sqrt{3} - \pi}{6}$$

Esercizio 130. Determinare  $k \in \mathbb{R}_0$  in modo che la tangente alla parabola  $y = kx^2 - (k+1)x + 2$  nel punto di ascissa  $x_0 = 2$  sia: a) parallela alla retta y = -3x + 1; b) perpendicolare alla retta  $y = \frac{1}{4}x - 7$ 

Soluzione. Calcoliamo la derivata della funzione che rappresenta la parabola

$$y' = 2kx - k - 1$$
  $y'(2) = 3k - 1$ 

questa è la relazione che esprime i coefficienti angolari delle tangenti al variare di k.

Caso a): la retta y = -3x + 1 ha coefficiente angolare m = -3, per cui

$$3k - 1 = -3$$
  $k = -\frac{2}{3}$ 

Caso b): la retta ha  $m = \frac{1}{4}$  e la retta ad essa perpendicolare avrà m = -4, per cui

$$3k - 1 = -4$$
  $k = -1$ 

#### Angolo tra due curve

Date due curve, le cui equazioni sono  $y=f_1(x)$  e  $y=f_2(x)$ , si definisce come angolo,  $\alpha$ , in un loro punto comune,  $P(x_0;y_0)$  quello formato dalle rispettive tangenti in questo punto. La relazione si ricava dalla trigonometria, ricordando quanto sopra detto,  $m=y_0'=\tan\alpha$ 

$$\tan\alpha = \frac{f_{2}^{'}(x_{0}) - f_{1}^{'}(x_{0})}{1 + f_{2}^{'}(x_{0}) \cdot f_{1}^{'}(x_{0})}$$

Esercizio 131. Trovare l'angolo  $\varphi$  formato dall'asse x e dalla tangente alla curva  $y=x-x^2$  nel punto di ascissa x=1.

Soluzione. La funzione assegnata è l'equazione di una parabola passante per l'origine (termine noto uguale a zero); Il punto considerato avrà coordinate

$$y = 1 - 1^2 = 0$$

una intersezione della parabola con l'asse x. Per ottenere l'equazione della tangente in questo punto, calcoliamo la derivata della funzione

$$y = 1 - 2x$$

se x=1, la derivata sarà y'=-1. L'equazione della tangente sarà

$$y - 0 = -1(x - 1)$$

da cui

$$y = -x + 1$$

L'angolo formato sarà

$$\tan \alpha = y_0' = -1$$

e quindi

$$\alpha = \arctan(-1) = 135^{\circ}$$

Esercizio 132. Determinare gli angoli formati dalle sinusoidi  $y_1 = \sin x$  e  $y_2 = \sin 2x$  e dall'asse delle ascisse nell'origine del piano cartesiano.

Soluzione. calcoliamo le derivate delle due funzioni

$$\begin{array}{rcl} y_{1}^{'} & = & \cos x \\ y_{2}^{'} & = & 2\cos x \end{array}$$

il loro valore nell'origine è

$$y_1'(0) = 1$$
  
 $y_2'(0) = 2$ 

la derivata nel punto indica il coefficiente angolare della retta tangente alla curva in quel punto, per cui

$$\tan \alpha = 1$$
  
 $\tan \beta = 2$ 

cioè

$$\alpha = 45^{\circ}$$
 $\beta = \arctan 2$ 

**Esercizio 133.** Determinare l'angolo sotto il quale la curva  $y = e^{0.5x}$  interseca la retta x = 2.

Soluzione. Determiniamo prima il punto di intersezione tra la retta e l'esponenziale:

$$\begin{cases} y = e^{0.5x} \\ x = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} y = e \\ x = 2 \end{cases}$$

ricordando che tale angolo è quello formato tra la tangente all'esponenziale e la retta nel punto assegnato, è necessario calcolare la derivata

$$m = \tan \alpha = y_2'(2) = \frac{e}{2}$$

questo angolo è quello formato dalla curva con l'asse x, cioè complementare a quello richiesto,  $\omega$ , che sarà

 $\omega = \frac{\pi}{2} - \alpha$ 

quindi

 $\tan \omega = \cot \alpha = \frac{2}{e}$ 

da cui

$$\omega = \arctan \frac{2}{e}$$

Esercizio 134. Determinare il punto della parabola

$$y = x^2 - 7x + 3$$

nel quale la tangente è parallela alla retta 5x + y - 3 = 0

**Soluzione.** se la tangente è parallela alla retta data, il suo coefficiente angolare è lo stesso della retta, cioè,  $m = -\frac{a}{b} = -\frac{5}{1} = -5$ . Ora il coefficiente angolare è uguale alla derivata della curva nel punto assegnato; quindi

$$y^{'} = 2x - 7 = -5$$

cioè

$$x = 1$$

il punto sarà quindi

$$P\left\{\begin{array}{ccc} x & = & 1\\ y & = & -3 \end{array}\right.$$

**Esercizio 135.** Determinare il punto della curva  $y^2 = 2x^3$  nel quale la tangente è perpendicolare alla retta 4x - 3y + 2 = 0.

Soluzione. determiniamo il coefficiente della retta assegnata

$$m = -\frac{a}{b} = \frac{4}{3}$$

la retta perpendicolare avrà coefficiente angolare antireciproco, cioè

$$m_{perp} = -\frac{3}{4}$$

calcoliamo la derivata della funzione implicita  $y^2 - 2x^3 = 0$ ,

$$2yy' - 6x^2 = 0$$

da cui

$$y' = \frac{3x^2}{y} = \frac{3x^2}{\pm x\sqrt{2x}}$$

tale derivata deve essere uguale a -3/4; pertanto

$$\pm \frac{3x}{\sqrt{2x}} = -\frac{3}{4}$$

cioè, con x > 0

$$\pm \frac{3x\sqrt{2x}}{2x} = -\frac{3}{4}$$

moltiplicando per il mcm

$$\pm 2\sqrt{2x} = -1$$

elevando al quadrato

$$8x = 1$$

da cui

$$x = \frac{1}{8}$$

le ordinate dei punti si ottengono sostituendo il valore trovato nella funzione

$$y = \pm \sqrt{\frac{2}{8^3}} = \pm \frac{1}{16}$$

Esercizio 136. Determinare l'angolo di intersezione delle due parabole

$$y = (x-2)^2$$
  $y = -x^2 + 6x - 4$ 

Soluzione. l'angolo richiesto è quello formato dalle tangenti alle due curve nel punto di intersezione; calcoliamo pertanto la loro intersezione

$$\begin{cases} y = (x-2)^2 \\ x^2 - 4x + 4 = -x^2 + 6x - 4 \end{cases}$$

risolvendo la seconda equazione, si ha

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

che dà

$$x = 4$$
  $x = 1$ 

i punti saranno quindi A(4;4) e B(1;1).

Determiniamo ora le derivate delle due funzioni

$$y' = 2x - 4$$
$$y' = -2x + 6$$

calcoliamo tali derivate nei due punti trovati

$$y^{'}(4) = 4$$
  $e$   $y^{'}(1) = -2$   
 $y^{'}(4) = -2$   $e$   $y^{'}(1) = 4$ 

le rette tangenti sono tra loro parallele e quindi l'angolo formato sarà lo stesso; applicando la formula per la determinazione di tale angolo tan  $\alpha = \frac{f_2'(x_0) - f_1'(x_0)}{1 + f_2'(x_0) \cdot f_1'(x_0)}$ , si ottiene

$$\tan \alpha = \frac{-2 - 4}{1 - 8} = -\frac{6}{7}$$

l'angolo sarà pertanto

$$\alpha = \arctan\left(-\frac{6}{7}\right) = 40^{\circ} 36'$$

Esercizio 137. Mostrare che le iperboli

$$xy = a^2 \qquad x^2 - y^2 = b^2$$

si intersecano sotto un angolo retto.

**Soluzione.** calcoliamo le funzioni che esprimono tutti i coefficienti angolari delle tangenti alle due curve in ogni punto mediante la derivata delle rispettive funzioni ed eguagliamole a zero

$$(xy = a^{2})' = y + xy' = 0$$
  $(x^{2} - y^{2} = b^{2})' = 2x - 2yy' = 0$ 

da cui

$$y' = -\frac{y}{x}$$
$$y' = \frac{x}{y}$$

i due coefficienti angolari sono antireciproci $\forall x, y$  e quindi le tangenti saranno sempre tra loro perpendicolari.

**Esercizio 138.** La legge di moto di un punto sull'asse OX è

$$x = 3t - t^3$$

Determinare la velocità di questo punto negli istanti  $t_0=0,\,t_1=1$  e  $t_2=2$ 


**Soluzione.** la velocità istantanea è definita come la derivata di  $\frac{dx}{dt}$ . Si tratta quindi di calcolare le derivate puntuali per i tempi indicati:

$$x^{'}(0) = 3 - 3t^{2} = 3$$
  
 $x^{'}(1) = 3 - 3t^{2} = 0$   
 $x^{'}(2) = 3 - 3t^{2} = -9$ 

Esercizio 139. La legge di moto di un punto materiale lanciato in alto nel piano verticale OXY con un angolo  $\alpha$  con l'orizzonte e con velocità iniziale  $v_0$  è data dalle formule (trascurando la resistenza dell'aria)

$$x = v_0 t \cos \alpha$$
  $y = v_0 t \sin \alpha - \frac{gt^2}{2}$ 

dove t è il tempo, g l'accelerazione della forza di gravità terrestre. Determinare la traiettoria del moto e la gittata. Determinare anche la grandezza della velocità del volo e la sua direzione.



Soluzione. Questo esercizio è la classica determinazione del moto parabolico; infatti si osserva che la componente orizzontale della velocità descrive un moto rettilineo uniforme, mentre quella verticale un moto accelerato. Ricavando infatti il tempo t dalla prima relazione e sostituendola nell'altra si ha

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

$$y = \frac{v_0 \sin \alpha \cdot x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{g}{2} \cdot \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

tale equazione, di secondo grado, è descritta da una curva parabolica e rappresenta la traiettoria del punto materiale. La gittata è rappresentata in figura dalla distanza OA; gli estremi di tali segmento sono i punti di intersezione della parabola con l'asse delle x, di cui uno, O, è scelto quale origine; quindi

$$x\tan\alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\alpha} = 0$$

raccogliendo la x e calcolando la soluzione diversa da zero, si ha

$$\tan\alpha = \frac{gx}{2v_0^2\cos^2\alpha}$$

da cui

$$x_A = \frac{2\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \cdot v_0^2 \cos^2\alpha}{q} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{q}$$

La componente orizzontale e verticale della velocità sono

$$v_x = \frac{dx}{dt} = v_0 \cos \alpha$$
  
 $v_y = \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \alpha - gt$ 

Esercizio 140. Un punto si muove sull'iperbole  $y = \frac{10}{x}$  in modo tale che la sua ascissa x cresce uniformemente alla velocità di un'unità per secondo. Qual è la velocità di variazione della sua ordinata quando il punto considerato coincide con il punto P(5;2)?

**Soluzione.** Le coordinate del punto mobile sono quelle che soddisfano l'equazione dell'iperbole riferita ai propri assi. La sua velocità si può esprimere come  $v_x = 1 \frac{u}{sec}$ ; ma  $v_y = y'$ , per cui

$$y^{'} = \frac{dy}{dx} = -\frac{10}{x^2}$$

calcoliamo  $y^{'}(5)$ , cioè la velocità nel punto x=5

$$y^{'}(5) = -\frac{10}{25} = -\frac{2}{5}$$

da cui

$$v_y = -0.4 \, \frac{m}{s}$$

Esercizio 141. Il raggio di una sfera cresce uniformemente con la velocità di  $5 \, cm/sec$ . Con quali velocità crescono la superficie ed il volume della sfera nel momento in cui il raggio è uguale a  $50 \, cm$ ?

Soluzione. Ricordiamo che la superficie e il volume in funzione del raggio, sono espresse da

$$S = 4\pi r^2 \qquad V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

La velocità di espansione può essere intesa come  $\frac{dr}{dt}=5\,\frac{cm}{sec}$ . Calcoliamo le velocità di espansione di superficie e volume, mediante la loro derivata rispetto al raggio

$$\frac{dS}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt} = 8\pi \cdot 0.50 \, m \cdot 0.05 \, \frac{m}{sec} = 0.2\pi \, \frac{m^2}{sec}$$

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} = 4\pi \cdot (0.50)^2 \, m^2 \cdot 0.05 \, \frac{m}{sec} = 0.05\pi \, \frac{m^3}{sec}$$

Esercizio 142. Un grande pallone sferico sta perdendo aria al ritmo di un decimo di un piede cubo al secondo (più concisamente,  $1 \, cm/s$ ). Quanto è veloce la diminuzione del raggio del palloncino quando il suo diametro è di  $6 \, cm$ ?

**Soluzione.** Sia R il raggio e V il volume del pallone. Allora

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Poiché la dimensioni del pallone è variabile, sia V che R sono funzioni del tempo. Esprimeremo questo fatto scrivendo

$$V = V(t)$$
  $R = R(t)$ 

Calcolando la derivata della relazione che esprime il volume rispetto al tempo (deriveremo come per le funzioni composte), avremo

$$V' = \frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi \cdot 3R^2 \frac{dR}{dt} = 4\pi R^2 \frac{dR}{dt}$$

Allora  $\frac{dR}{dt}$  sarà la velocità con la quale diminuisce il raggio del pallone e risolvendo rispetto ad essa

$$\frac{dR}{dt} = \frac{dV}{dt} \cdot \frac{1}{4\pi R^2}$$

e sostituendo i valori assegnati per il ritmo di riduzione del volume

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{4\pi R^2} \frac{cm^3}{s}$$

Notiamo che  $\frac{dV}{dt}$  è negativo perché il pallone si sta sgonfiando. Quando il raggio del pallone è pari a  $30\,cm$  avremo

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{1}{144\pi} \frac{cm}{s}$$

Esercizio 143. Siano date le due funzioni

$$f(x) = x^2 - 3x + 3$$
  $g(x) = x^3 - 11x + 15$ 

Risolvere l'equazione f'(x) = g'(x) e sia  $x_0$  la soluzione nell'intervallo [0; 4]. Considerare il punto di ascissa  $x_0$  sul grafico delle due funzioni. Che cosa si può dedurre?

Soluzione, calcoliamo le derivate delle due funzioni polinomiali di secondo e terzo grado

$$f'(x) = 2x - 3$$
  $g'(x) = 3x^2 - 11$ 

L'uguaglianza è vera per

$$2x - 3 = 3x^2 - 11$$

cioè

$$3x^2 - 2x - 8 = 0$$

risolvendo, si ha, applicando la formula ridotta

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{3}$$

da cui  $x_1 = 2$  e  $x_2 = -\frac{4}{3}$ .

Troviamo le intersezioni delle funzioni f e g:

$$x^3 - x^2 - 8x + 12 = 0$$

si nota che x=2 è una radice dell'equazione (infatti:  $2^3-2^2-16+12=0$ ); anche le derivate si incontrano in questo punto e quindi, nel punto x=2 le due funzioni hanno la stessa tangente.

Esercizio 144. Determinare i punti in cui l'iperbole equilatera di equazione

$$y = \frac{x-1}{x+3}$$

ha la tangente inclinata di  $\frac{\pi}{4}$  sull'asse x.

Soluzione. l'inclinazione di una retta tangente in un punto è espressa tramite il suo coefficiente angolare, cioè l'angolo che la retta forma con l'asse delle x,  $m = \tan \alpha$ ; ma tale coefficiente angolare è pure espresso dal limite del rapporto incrementale, quando l'incremento tende a zero, cioè la derivata della funzione, m = y'.

Ora se l'inclinazione è pari a  $\frac{\pi}{4}$ , vuol dire che la retta forma un angolo di 45°, cioè è la bisettrice del 1° e 3° quadrante di equazione y=x; tale retta ha coefficiente angolare m=1 e la derivata di y, deve pertanto essere uguale a 1.

Calcoliamo quindi la derivata della funzione

$$y' = \frac{1(x+3) - 1(x-1)}{(x+3)^2} = 1$$

da cui

$$\frac{4}{\left(x+3\right)^2} = 1$$

moltiplicando per il mcm diverso da zero, si ha

$$4 = x^{2} + 6x + 9 x^{2} + 6x + 5 = 0$$
$$x_{1} = -5 x_{2} = -1$$

I punti sono quindi P(-5; 5) e Q(-1; 1)

Esercizio 145. Determinare l'ampiezza dell'angolo compreso dalle tangenti alla parabola

$$y = x^2 - 5x + 6$$

nei suoi punti di intersezione con l'asse x.

**Soluzione.** Determiniamo prima i punti in cui la parabola interseca l'asse x, cioè quelli aventi ordinata nulla:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$
  
$$x_1 = 2 x_2 = 3$$

Calcoliamo ora la derivata della funzione nei punti di ascissa  $x_{1,2}$ :

$$y' = 2x - 5$$

$$y_{1}^{'}(2) = -1$$
  
 $y_{2}^{'}(3) = 1$ 

Si ha quindi

$$\tan \alpha = 1$$
  $\alpha = \frac{\pi}{4}$   $\tan \beta = -1$   $\beta = \frac{3}{4}\pi$ 

da cui

$$\beta - \alpha = \frac{\pi}{2}$$

Esercizio 146. Data la curva di equazione

$$y = x^3 - x^2 - x + 1$$

determinare le equazioni delle tangenti nei suoi punti di intersezione con gli assi.

Soluzione. Calcoliamo i punti di intersezione con l'asse x, cioè i punti ad ordinata nulla:

$$x^3 - x^2 - x + 1 = 0$$

con raccoglimento parziale

$$x^{2}(x-1) - (x-1) = 0$$
  
 $(x-1)^{2}(x+1) = 0$ 

I punti sono A(1;0), in cui la curva è tangente all'asse x, e B(-1;0). Calcoliamo ora la derivata della funzione nei punti ottenuti

$$y' = 3x^2 - 2x - 1$$

$$y'(1) = 0$$
  
 $y'(-1) = 4$ 

Una tangente avrà m=0, e sarà quindi, come detto, la retta y=0; la seconda tangente avrà equazione (conoscendo m e un punto)

$$y - 0 = 4(x + 1)$$

cioè

$$y = 4x + 4$$

Calcoliamo ora l'intersezione con l'asse y, cioè i punti ad ascissa nulla:

$$y(0) = 1$$

Il punto sarà C(0;1). Calcoliamo la derivata in questo punto

$$y^{'}\left(0\right) = -1$$

la retta sarà quindi

$$y - 1 = -1x$$

cioè

$$y = -x + 1$$

Esercizio 147. Scrivere le equazioni delle tangenti alla parabola  $y=x^2-3x+4$  nei suoi punti di intersezione con la retta y=x+1

determiniamo prima i punti di intersezione

$$\begin{cases} x+1 = x^2 - 3x + 4 \\ y = x + 1 \end{cases} \begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0 \\ y = x + 1 \end{cases}$$
$$A(1; 2) \qquad B(3; 4)$$

Per trovare le equazioni delle equazioni, calcoliamo prima la derivata della funzione

$$y' = 2x - 3$$

e poi calcoliamo le due derivate puntuali

$$y^{'}(1) = -1$$
  
 $y^{'}(3) = 3$ 

La tangente in A sarà:

$$y-2 = -1(x-1)$$
  $y = -x+3$ 

$$y-4=3(x-3)$$
  $y=3x-5$ 

**Esercizio 148.** Data la funzione f definita in  $\mathbb{R}$ :

$$f: x \to 2x^3 - x^2 + 2x + 4$$

sia C il suo grafico. Determinare i punti di C in cui la tangente è parallela alla retta y = 6x - 1.

Soluzione. I coefficienti angolari delle tangenti alla curva sono espressi dalla derivata della funzione

$$y' = 6x^2 - 2x + 2$$

Tale derivata deve essere uguale al coefficiente angolare della retta assegnata, m=6, per cui

$$6x^2 - 2x - 4 = 0$$

le soluzioni di questa equazione sono

$$x_1 = -\frac{2}{3}$$
  $x_2 = 1$ 

I punti saranno, sostituendo nella equazione della curva C,

$$\left(-\frac{2}{3}; \frac{44}{27}\right)$$
 (1;7)

**Esercizio 149.** Determinare a,b,c,d in modo che la curva di equazione  $y=\frac{ax^2+b}{cx+d}$  abbia come asintoto una retta parallela a y=2x+2 e abbia nel punto  $A\left(0;1\right)$  la tangente inclinata di  $\frac{\pi}{4}$  sull'asse x.

**Soluzione.** La curva avrà un asintoto obliquo di equazione y = mx + q, se

$$m = \lim_{x \to \infty} \frac{ax^2 + b}{cx^2 + dx} = \frac{a}{c} = 2$$

$$q = \lim_{x \to \infty} \frac{ax^2 + b}{cx + d} - \frac{ax}{c} = -\frac{ad}{c^2} = 2$$

Il punto A appartiene alla curva e le sue coordinate soddisfano quindi l'equazione della stessa:

$$1 = \frac{b}{d}$$

La derivata della funzione è:

$$y' = \frac{2ax(cx+d) - c(ax^2 + b)}{(cx+d)^2} = \frac{acx^2 + 2adx - bc}{(cx+d)^2}$$

tale derivata deve valere 1,  $(m = \tan \frac{\pi}{4} = y^{'}(0) = 1)$  nel punto dato:

$$1 = -\frac{bc}{d^2}$$

Componendo tutte le condizioni, si ha:

$$\begin{cases}
a = 2c \\
-ad = 2c^2 \\
b = d \\
-bc = d^2
\end{cases}$$

riscriviamo l'equazione dividendo tutto per c

$$y = \frac{\frac{a}{c}x^2 + \frac{b}{c}}{\frac{c}{c}x + \frac{d}{c}}$$

ma, dalla prima equazione del sistema  $\frac{a}{c} = 2$ , per cui, si ha

$$y = \frac{2x^2 + \frac{b}{c}}{x + \frac{d}{c}}$$

ma, dalla terza equazione, b = d, per cui

$$y = \frac{2x^2 + \frac{d}{c}}{x + \frac{d}{c}}$$

la seconda equazione  $\frac{ad}{c^2}=-2$  si può riscrivere come  $\frac{a}{c}\cdot\frac{d}{c}=-2$ , ma  $\frac{a}{c}=2$ , pertanto cioè  $\frac{d}{c}=-1$ e l'equazione cercata sarà

$$y = \frac{2x^2 - 1}{x - 1}$$

Esercizio 150. Determinare i coefficienti a e b in modo che la curva di equazione:

$$y = a\sin 2x + b\cos x$$

abbia nel punto  $\left(\frac{\pi}{4}; 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  tangente parallela alla bisettrice del secondo e quarto quadrante.

Soluzione. Il punto appartiene alla curva; sostituisco quindi le coordinate del punto

$$1 + \frac{\sqrt{2}}{2} = a + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

cioè a = 1

la tangente dovrà avere coefficiente angolare m=-1; calcolo la derivata

$$y' = 2a\cos 2x - b\sin x$$

nel punto indicato, la derivata avrà valore -1, quindi

$$-1 = -b\frac{\sqrt{2}}{2}$$

da cui si ricava  $b = \sqrt{2}$ 

**Esercizio 151.** Una pietra è lanciata verticalmente verso l'alto a partire da terra con una velocità iniziale  $v_0=32\,\frac{m}{s}$  si muove secondo la legge oraria

$$s = s(t) = 32t - 5t^2$$

dove t è espresso in secondi ed s l'altezza via via raggiunta dalla pietra contata a partire da terra. Dopo quanto tempo la pietra si fermerà per poi ricadere? qual è l'altezza massima raggiunta?

**Soluzione.** La velocità istantanea in ogni momento di una particella può essere espressa, a partire dalla legge oraria, come

$$v\left(t\right) = \lim_{\Delta t \to 0} v_{media}\left(t, \Delta t\right) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s\left(t + \Delta t\right) - s\left(t\right)}{\Delta t}$$

Questa è naturalmente la derivata

$$v\left(t\right) = s'\left(t\right) = \frac{ds\left(t\right)}{dt}$$

della distanza in funzione del tempo. Nel caso in esame, calcolando la derivata di s(t) rispetto a t troveremo la legge delle velocità, cioè come varia la velocità rispetto al tempo.

$$v\left(t\right) = 32 - 10t$$

La pietra interrompe la salita e inizia la discesa quando la sua velocità passa da valori positivi a valori negativi. La sua velocità è quindi nulla. Quindi se poniamo v=0, avremo

$$32 - 10t = 0$$
  $t = 3, 2s$ 

Per trovare l'altezza massima, sostituiamo il valore del tempo trovato nella legge oraria


$$s(3,2) = 32 \times 3, 2 - 5 \times 3, 2^2 = 51, 2m$$

Qualora volessimo trovare l'accelerazione, ripeteremo quanto detto, questa volta definendo l'accelerazione istantanea come il limite della velocità media al tendere di  $\Delta t$  a zero. Per trovare come varia l'accelerazione in funzione del tempo, calcoleremo quindi la derivata della legge delle velocità

$$a\left(t\right) = -10\,\frac{m}{s^2}$$

cioè l'accelerazione è costante e quindi il moto è uniformemente accelerato.

Possiamo vedere anche graficamente queste leggi essendo delle funzioni matematiche in una variabile.



Questi grafici non descrivono però la traiettoria della pietra che è verticale.

Esercizio 152. Dato il moto rettilineo di equazione  $s = 2t^5 - 160t^2 + t - 1$ , trovare in quale istante l'accelerazione è nulla.

Soluzione. La legge oraria va considerata con le grandezze tempo e spostamento variabili con continuità, pertanto le definizioni di velocità e di accelerazione vanno riscritte mediante l'utilizzo del limite del loro rapporto incrementale, cioè mediante l'introduzione delle derivate. Pertanto

$$v = s' = \frac{ds}{dt}$$
  $a = s$ "  $= \frac{d^2s}{dt}$ 

Calcoliamo quindi la derivata seconda della legge oraria:

$$v = 10t^4 - 320t + 1$$
  $a = 40t^3 - 320$ 

L'accelerazione a sar $\grave{a}=0$  quando

$$t^3 = 8 \qquad t = 3s$$

Esercizio 153. Una pietra viene lanciata nel vuoto verticalmente verso l'alto, a partire dal suolo, con una velocità iniziale di 147  $\frac{m}{s}$ . Trovare la massima altezza raggiunta dalla pietra sapendo che la sua distanza s dal suolo dopo t secondi è  $s=147t-4,9t^2$ .

**Soluzione.** La velocità iniziale è  $v_0 = 147 \frac{m}{s}$ . La massima altezza viene raggiunta dalla pietra quando la sua velocità si ridurrà a zero, dopo di che la pietra ridiscenderà. Calcoliamo quindi la velocità

$$\frac{ds}{dt} = v = 147 - 9, 8t = 0$$

per cui

$$v = \frac{147}{9.8} = 15 \, s$$

Per t = 15 s, la distanza percorsa (massima altezza) sarà

$$s = 147 \times 15 - 4,9 \times 15^2 = 1102,5 \, m$$

Esercizio 154. Un corpo viene lanciato nel vuoto verticalmente verso l'alto con una velocità iniziale  $v_0$ . Sapendo che dopo 1 s la sua velocità è tripla di quella che avrà dopo 5 s, trovare  $v_0$ .

**Soluzione.** La legge oraria di un tale moto decelerato per effetto della gravità che richiama verso il basso il corpo è, sapendo che l'accelerazione di gravità terrestre è pari a  $9, 8 \frac{m}{s^2 2}$ 

$$s = v_0 t - 4,9t^2$$

La legge delle velocità è espressa da  $v = v_o - gt = v_0 - 9, 8t$ .

Dopo 1 s, la velocità sarà  $v(1) = v_0 - 9$ , 8, mentre dopo 5 s,  $v(5) = v_0 - 59$ . Sappiamo che v(1) = 3v(5), per cui

$$v_0 - 9, 8 = 3(v_0 - 49)$$
  $2v_0 = 137, 2$   $v_0 = 68, 6\frac{m}{s}$ 

Esercizio 155. Un corpo viene lanciato verticalmente verso l'alto e lo spazio è legato al tempo dalla legge oraria  $s = v_0t - 4, 9t^2$ , ove  $v_0$  indica la velocità all'istante t = 0. Quanto deve valere la velocità  $v_0$  affinché il corpo raggiunga l'altezza di 20,4 con una velocità di 0,4  $\frac{m}{a}$ ?

Le leggi del moto sono  $s = v_0t - 4,9t^2$  e  $v = v_0 - 4,9t$ . Sostituiamo i valori assegnati per la posizione e la velocità finale, scrivendo le equazioni sotto forma di sistema (due incognite)

$$\begin{cases}
20, 4 = v_0 t - 4, 9t^2 \\
0, 4 = v_0 - 9, 8t
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
20, 4 = v_0 \cdot \frac{v_0 - 0, 4}{9, 8} - 4, 9\left(\frac{v_0 - 0, 4}{9, 8}\right)^2 \\
t = \frac{v_0 - 0, 4}{9, 8}
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
20, 4 = v_0 \cdot \frac{v_0 - 0, 4}{9, 8} - 4, 9\left(\frac{v_0 - 0, 4}{9, 8}\right)^2 \\
t = \frac{v_0 - 0, 4}{9, 8}
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
1959, 216 = 4, 9v_0^2 \\
t = \frac{v_0 - 0, 4}{9, 8}
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
v_0 = 20 \\
t = 2
\end{cases}$$

Esercizio 156. Un punto P descrive la curva  $\gamma$  di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \sin 2t \\ y = \cos t \end{cases}$$

trovare l'equazione cartesiana di  $\gamma$  e la velocità di P all'istante t=0 e dopo  $\pi$  secondi.

Soluzione. Trovare l'equazione cartesiana vuol dire trovare una relazione tra le variabili x e y nella quale non compare il tempo t. Eleviamo quindi al quadrato le equazioni del sistema

$$\begin{cases} x^2 = 4\sin^2 t \cos^2 t \\ y^2 = \cos^2 t \end{cases} \begin{cases} x^2 = 4\left(1 - \cos^2 t\right)\cos^2 t \\ y^2 = \cos^2 t \end{cases} \begin{cases} x^2 = 4\left(1 - y^2\right)y^2 \\ y^2 = \cos^2 t \end{cases}$$

l'equazione cercata è quindi

$$4y^4 - 4y^2 + x^2 = 0$$


La velocità del punto, in modulo, è data da

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = \sqrt{4\cos^2 2t + \sin^2 t} = \sqrt{4 + 4\sin^4 t - 15\sin^2 t}$$

da cui, essendo  $\sin 0 = \sin \pi = 0$ 

$$v\left(0\right) = v\left(\pi\right) = 2$$

Esercizio 157. Quando il prezzo di una materia prima essenziale (come la benzina) aumenta rapidamente, i consumi all'inizio calano lentamente. Se il prezzo continua a salire, tuttavia, si può avere un punto di "inversione", in cui il consumo ha un improvviso calo. Supponiamo che il grafico sotto mostri il consumo di benzina, G(t), in milioni di galloni, in una certa area. Partiamo dal presupposto che il prezzo sta aumentando rapidamente. Qui t è il tempo in mesi dopo che il prezzo ha iniziato a salire. Utilizzare il grafico per rispondere ai quesiti: a)  $\lim_{t\to 12} G(t)$ ; b)  $\lim_{t\to 16^-} G(t)$ ; c) G(16); d) punto di inversione.




Soluzione. Osservando il grafico proposto possiamo ottenere

$$\lim_{t\to 12}G\left(t\right)=3\quad \lim_{t\to 16^{-}}G\left(t\right)=2\quad G\left(16\right)=2$$

il punto di inversione della tendenza con un brusco calo si ha per t = 16. La funzione in questo punto ha un salto pari a 0, 5. In t = 16, la funzione non è continua.

Esercizio 158. Molti uccelli hanno muscoli di volo il cui dispendio di potenza varia con la velocità in un modo simile al grafico mostrato sotto. L'asse orizzontale del grafico mostra la velocità in metri al secondo e l'asse verticale la potenza in watt per chilogrammo.



- a) La velocità  $v_{mp}$  minimizza i costi energetici per unità di tempo. Qual è la pendenza della linea tangente alla curva in corrispondenza di punto corrispondente a  $v_{mp}$ ? Qual è il significato fisico della pendenza in quel punto?
- b) La velocità  $v_{mr}$  minimizza i costi energetici per unità di distanza coperta. Stimare la pendenza della curva nel punto corrispondente a  $v_{mr}$ . Dai il significato della pendenza in quel punto.
- c) Osservando la forma della curva, descrivi come varia la potenza al variare della velocità.

**Soluzione.** a) La tangente nel punto indicato è parallela all'asse x e quindi la sua pendenza è nulla. In questo caso avremo una condizione di minimo quando la potenza spesa assume il valore più basso. La pendenza ha come unità di misura  $\frac{W}{kg} \cdot \frac{s}{m}$  ma essendo  $W = kg\frac{m^2}{s^3}$ , si ha  $[m] = \frac{m^2}{s^3} \cdot \frac{s}{m} = \frac{m}{s^2}$  che è l'unità di misura di una accelerazione. Tale pendenza è il valore della derivata prima della funzione che descrive tale relazione per il valore della velocità  $v_{mn}$ .

- b) In questo caso la tangente ha coefficiente angolare  $m \simeq \frac{60}{10,5} = 5,7$ ; in corrispondenza di una  $v = 10, 5 \frac{m}{s}$  la potenza necessaria è di circa  $60 \frac{W}{kq}$ .
- c) La potenza spesa diminuisce per velocità comprese tra  $0 < v < v_{mp}$ , mentre aumenta per velocità  $v > v_{mp}$ ; la derivata prima sarà negativa nel primo intervallo, positiva nel secondo e nulla per  $v = v_{mp}$

Esercizio 159. La scala Richter fornisce una misura della magnitudine di un terremoto. Infatti, il più grande valore di M mai registrato per un terremoto fu 8,9 nel terremoto del 1933 in Giappone. La seguente formula mostra una relazione tra la quantità di energia rilasciata e il corrispettivo valore della scala Richter.

$$M = \frac{2}{3} \log \frac{E}{0,007}$$

dove E è misurata in kWh. a) Per il terremoto del 1933, quale valore di E dà un numero Richter M=8,9? b) Trova il tasso di variazione del numero M di Richter in funzione dell'energia quando  $E=7,0\cdot 10^5\,kWh$ ?

**Soluzione.** a) Se M = 8, 9, l'equazione diviene

$$8,9 = \frac{2}{3}\log\frac{E}{0,007}$$

da cui

$$\log \frac{E}{0,007} = \frac{3}{2} \times 8,9 = 13,35$$

cioè, applicando la definizione di logaritmo (in base 10)

$$E = 0.007 \times 10^{13,35}$$
  $E = 1.57 \cdot 10^{11} \, kWh$ 

b) il tasso di variazione in funzione di E si ottiene calcolando la derivata prima della funzione, dove  $\log \frac{E}{0.007} = \log E - \log 0,007$ 

$$M' = \frac{2}{3} \frac{1}{\ln 10 \cdot E} = \frac{2}{3} \frac{E}{\ln 10 \times 0.07^2} = \frac{0.29}{E}$$

Se  $E = 7, 0 \cdot 10^5$ , e

$$M' = \frac{0.29}{7.0 \cdot 10^5} = 4.1 \cdot 10^{-7}$$

Esercizio 160. Il numero di persone P(t) (in centinaia) infettate in t giorni dopo l'inizio di un'epidemia è approssimato dalla seguente relazione

$$P(t) = \frac{10\ln(0, 19t + 1)}{0, 19t + 1}$$

Quando il numero di persone infette inizierà a diminuire?

**Soluzione.** Si tratta di studiare quando la funzione data è crescente e decrescente e quali sono i punti stazionari. Calcoliamo quindi la sua derivata e studiamo quando si annulla.

$$P'(t) = \frac{\frac{1.9}{0.19t+1}(0.19t+1) - 1.9\ln(0.19t+1)}{(0.19t+1)^2} = \frac{1.9 - 1.9\ln(0.19t+1)}{(0.19t+1)^2} = 0$$

La derivata si annulla quando il numeratore si annulla

$$ln(0, 19t + 1) = 1$$

cioè

$$0,19t+1=e$$
  $t=\frac{e-1}{0,19}=9,04$ 

Esercizio 161. Un'auto rotola giù da una collina. La sua distanza (in metri) dal suo punto di partenza è data da  $s(t) = 1.5t^2 + 4t$ , dove t è in secondi. (a) Fino a che distanza si sposterà l'auto dopo 10 secondi? (b) Qual è la velocità a 5 secondi? A 10 secondi? (c) Perché puoi dire dalla v(t) che l'auto non si fermerà? (d) Qual è l'accelerazione a 5 secondi? A 10 secondi? (e) Cosa sta succedendo alla velocità e all'accelerazione quando t aumenta?

**Soluzione.** a) dopo 10 s l'auto avrà percorso una distanza s(10) = 150 + 40 = 190 m; b) Calcoliamo la legge delle velocità tramite la derivata della legge oraria

$$v\left(t\right) = \frac{d\left(t\right)}{dt} = 3.0t + 4$$

per cui  $v\left(5\right)=15+4=19\,\frac{m}{s};\ v\left(10\right)=30+4=34\,\frac{m}{s}.$ c) la velocità cresce linearmente con il tempo; l'accelerazione può essere ricavata dalla derivata della legge delle velocità

$$a = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2s(t)}{dt^2} = 3.0$$

da cui si vede che l'accelerazione è costante e la legge oraria descrive un moto uniformemente accelerato.

Esercizio 162. La punta di una penna stilografica viene posta su un tampone di inchiostro, formando un cerchio la cui area aumenta alla velocità costante di 0.03 cm<sup>2</sup>/s. Trova la velocità con cui il raggio del cerchio cambia quando il cerchio ha un raggio di 0.5 cm.

Soluzione. Introduciamo le quantità coinvolte: t: tempo, A: area, r: raggio del cerchio. A e r sono funzioni del tempo. Scriviamo le informazioni presenti nel testo in forma di equazioni

$$\frac{dA}{dt} = 0,03 \quad A = \pi r^2$$

Si tratta di trovare de de quando r=0,5. Deriviamo rispetto al tempo entrambi i membri dell'equazione  $A=\pi r^2$  e avremo

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$$

da cui

$$2\pi r \frac{dr}{dt} = 0.03$$

Poniamo ora r=0,5 e risolviamo rispetto a dr/dt, avremo

$$2\pi \cdot \frac{1}{2} \frac{dr}{dt} = 0,03$$

da cui

$$\frac{dr}{dt} = \frac{0.03}{\pi} \, \frac{cm^2}{s}$$

## Teoremi del calcolo differenziale

#### Teorema di Rolle

**Esercizio 163.** Verifica se la funzione  $f(x) = x^2 - 4x + 1$  nell'intervallo I = [0; 4] soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle e, in caso affermativo, trova i punti dell'intervallo che verificano il teorema.

**Soluzione.** Ricordiamo che il teorema di Rolle afferma che: se una funzione è continua in un intervallo chiuso [a, b] e derivabile nell'intervallo aperto [a, b] e se f(a) = f(b), allora esiste almeno un punto c appartenente all'intervallo per il quale si ha f'(c) = 0. Il significato geometrico implica che, la retta tangente al grafico nel punto c è parallela all'asse delle ascisse.

Nel nostro caso la funzione è polinomiale di secondo grado ed è quindi sempre continua nell'intervallo chiuso e derivabile in quello aperto; verifichiamo la seconda condizione

$$f(0) = 1$$
  $f(4) = 1$ 

calcoliamo la derivata

$$f'(x) = 2x - 4 = 0$$
  $x_c = 2$ 

**Esercizio 164.** Verifica se la funzione  $f(x) = \ln(3 - x^2)$  nell'intervallo I = [-1; 1] soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle e, in caso affermativo, trova i punti dell'intervallo che verificano il teorema.

Soluzione. Calcoliamo il dominio della funzione

$$3 - x^2 > 0$$
  $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$ 

l'intervallo assegnato è contenuto nel dominio e quindi la funzione è continua in esso e derivabile nell'intervallo aperto. Verifichiamo la seconda condizione

$$f(-1) = \ln 2$$
  $f(1) = \ln 2$ 

Calcoliamo la derivata

$$f'(x) = \frac{-2x}{3 - x^2} = 0$$
  $x_c = 0$ 

**Esercizio 165.** Verifica se la funzione  $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+x}$  nell'intervallo  $I = \left[\frac{1}{4}; 4\right]$  soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle e, in caso affermativo, trova i punti dell'intervallo che verificano il teorema.

Soluzione. Determiniamo il dominio della funzione

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ x \ne -1 \end{cases} \quad x \ge 0$$

l'intervallo è contenuto nel dominio; calcoliamo la derivata

$$f'(x) = \frac{\frac{1+x}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x}}{(1+x)^2} = \frac{1-x}{2\sqrt{x}(1+x)^2}$$

il suo dominio è x>0 sempre contenuto nell'intervallo indicato

Verifichiamo la seconda condizione

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{2}{5} \quad f\left(4\right) = \frac{2}{5}$$

avremo

$$f'(x) = 0$$
 per  $x_c = 1$ 

Esercizio 166. Verifica se la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & -\frac{1}{2} \le x < 1 \\ -x^2 + 4x + 1 & 1 \le x \le 4 \end{cases}$$

soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle e, in caso affermativo, trova i punti dell'intervallo che verificano il teorema.

**Soluzione.** Le due parti sono verificano le condizioni di continuità e derivabilità; la funzione completa ha come dominio  $\left[-\frac{1}{2};4\right]$ . Calcoliamo le derivate

$$f(x) = \begin{cases} 2 & -\frac{1}{2} \le x < 1 \\ -2x + 4 & 1 < x < 4 \end{cases}$$

Ora

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(4\right) = 1$$

la derivata si annulla per  $x_c = 2$ .

#### Teorema di Lagrange

Il teorema afferma che se una funzione è continua in un intervallo chiuso [a, b] (con a < b) e derivabile nell'intervallo aperto ]a, b[, allora esiste almeno un punto  $c \in ]a, b[$  tale che

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Esercizio 167. Verifica se la funzione  $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$  soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell'intervallo I = [0; 1] e in caso affermativo, trova i punti dell'intervallo che verificano il teorema.

Soluzione. La funzione polinomiale intera e il suo dominio è tutto l'insieme reale, così come per la sua derivata e quindi le condizioni sono soddisfatte; calcoliamo la derivata prima

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$$

inoltre

$$f(1) = 3$$
  $f(0) = -1$   $b - a = 1$ 

pertanto

$$3x^2 - 4x + 5 = \frac{3+1}{1} = 4$$

risolvendo

$$3x^2 - 4x + 1 = 0$$
  $x = 1 \notin ]0;1[$   $x_c = -\frac{1}{3}$ 

Esercizio 168. Verifica se la funzione  $f(x) = \sqrt{x^2 - 1} - 2x$  soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell'intervallo  $I = \begin{bmatrix} 1; \sqrt{5} \end{bmatrix}$  e in caso affermativo, trova i punti dell'intervallo che verificano il teorema.

**Soluzione.** Il dominio della funzione è  $x^2 - 1 \ge 0$ , cioè  $x \le -1 \lor x \ge 1$ ; la derivata è

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} - 2$$

il suo dominio è pertanto  $x<-1 \lor x>1$ ; la funzione è quindi continua nell'intervallo chiuso e derivabile in quello aperto. Avremo

$$f(\sqrt{5}) = 2(1 - \sqrt{5})$$
  $f(1) = -2$   $b - a = \sqrt{5} - 1$ 

per cui

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} - 2 = \frac{2 - 2\sqrt{5} + 2}{\sqrt{5} - 1} = \frac{\left(4 - 2\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{5} + 1\right)}{\left(\sqrt{5} - 1\right)\left(\sqrt{5} + 1\right)} = \frac{\sqrt{5} - 3}{2}$$

avremo quindi

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$$

elevando al quadrato e svolgendo si ha

$$4x^{2} - x^{2} \left(\sqrt{5} + 1\right)^{2} = -\left(\sqrt{5} + 1\right)^{2}$$
$$2x^{2} \left(\sqrt{5} + 1\right) = \left(\sqrt{5} + 1\right)^{2}$$

da cui considerando solo la soluzione positiva si ha

$$x_c = \sqrt{\frac{\sqrt{5} + 1}{2}}$$

Esercizio 169. Verifica se la funzione  $f(x) = \frac{x^2 - 3x}{4 - x}$  soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell'intervallo I = [0; 2] e in caso affermativo, trova i punti dell'intervallo che verificano il teorema.

**Soluzione.** Il dominio della funzione è  $4-x\neq 0$ , cioè  $x\neq 4$ ; la derivata è

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(4-x) + x^2 - 3x}{(4-x)^2} = -\frac{x^2 - 8x + 12}{(4-x)^2}$$

il suo dominio è ancora  $x \neq 4$ ; la funzione è quindi continua nell'intervallo chiuso e derivabile in quello aperto. Avremo

$$f(2) = -1$$
  $f(0) = 0$   $b - a = 2$ 

per cui

$$-\frac{x^2 - 8x + 12}{(4-x)^2} = \frac{-1-0}{2} = -\frac{1}{2}$$

svolgendo si ha

$$\frac{x^2 - 8x + 8}{\left(4 - x\right)^2} = 0 \qquad x_c = 4 - 2\sqrt{2}$$

la radice positiva non appartiene al dominio.

Esercizio 170. Verifica se la funzione  $f(x) = 2e^x - x$  soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell'intervallo I = [0; 2] e in caso affermativo, trova i punti dell'intervallo che verificano il teorema.

**Soluzione.** Il dominio della funzione è l'insieme reale, così come quello della derivata  $f'(x) = 2e^x - 1$ . Avremo

$$f(2) = 2e^2 - 2$$
  $f(0) = 2$   $b - a = 2$ 

per cui

$$2e^x - 1 = \frac{2e^2 - 2 - 2}{2} = e^2 - 2$$

svolgendo

$$e^x = \frac{e^2 - 1}{2} \qquad x_c = \ln \frac{e^2 - 1}{2}$$

## Teorema di Cauchy

Se due funzioni f(x) e g(x) sono continue in un intervallo chiuso [a,b]e derivabili nell'intervallo aperto [a,b[, allora esiste almeno un punto c per il quale

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

 $\operatorname{con}\,g'\left(c\right)\neq0.$ 

Esercizio 171. Verificare se la funzione  $f(x) = 2x^2 + 2x - 3$  e la funzione  $g(x) = x^2 - 4x + 6$  soddisfano le ipotesi del teorema di Cauchy nell'intervallo I = [0; 1], e, in caso affermativo, trovare i punti dell'intervallo che verificano il teorema.

**Soluzione.** Le due funzioni sono entrambe polinomiali intere e sono continue e derivabili nell'insieme reale. Calcoliamo le loro derivate prime

$$f'(x) = 4x + 2$$
  $g'(x) = 2x - 4$ 

inoltre la derivata di g è diversa da zero per ogni punto dell'intervallo I

$$f(1) = 1$$
  $f(0) = -3$   $b - a = 1$   
 $g(1) = 3$   $g(0) = 6$   $b - a = 1$ 

Avremo quindi

$$\frac{2x+1}{x-2} = -\frac{4}{3}$$

risolvendo

$$x_c = \frac{1}{2}$$

**Esercizio 172.** Verificare se la funzione  $f(x) = \ln x$  e la funzione g(x) = x + 3 soddisfano le ipotesi del teorema di Cauchy nell'intervallo I = [1; 3], e, in caso affermativo, trovare i punti dell'intervallo che verificano il teorema.

**Soluzione.** La funzione f(x) ha dominio x > 0, mentre la g(x) ha dominio  $\mathbb{R}$ . Le loro derivate prime sono

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$
  $g'(x) = 1$ 

e quindi sono entrambe derivabili nell'intervallo I, inoltre la funzione g(x) è costante e diversa da zero.

$$f(3) = \ln 3$$
  $f(1) = 0$   $b - a = \ln 3$   
 $g(3) = 6$   $g(1) = 4$   $b - a = 2$ 

Avremo quindi

$$\frac{1}{x} = \frac{\ln 3}{2}$$

da cui

$$x_c = \frac{2}{\ln 3}$$

## Studio dei punti di non derivabilità

Esercizio 173. Studiare la continuità e derivabilità della funzione  $f(x) = (2x - 3) \sqrt[3]{x}$ .

Soluzione. La funzione è continua in tutto l'insieme reale. Calcoliamo la sua derivata prima

$$f' = 2\sqrt[3]{x} + \frac{1}{3}(2x - 3)\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{6x\sqrt[3]{x} + (2x - 3)\sqrt[3]{x}}{3x} = \frac{8x - 3}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

il dominio della derivata è  $D : \mathbb{R} - \{0\}$ .

La funzione si annulla per x = 0, valore non attribuibile alla funzione derivata.

Calcoliamo i limiti destro e sinistro

$$\lim_{x \to 0} \frac{8x - 3}{3\sqrt[3]{x^2}} = \frac{-3}{0} = -\infty$$

la funzione ha in x = 0 un punto di flesso a tangente verticale.

**Esercizio 174.** Studiare la continuità e derivabilità della funzione  $f(x) = (x-1)^2 |x-1|$ .

Soluzione. La funzione si può considerare come divisa in due parti

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^3 & x \ge 1\\ (1-x)^3 & x < 1 \end{cases}$$

la funzione è sempre rappresentata da un polinomio intero di 3° grado e sarà quindi sempre continua. Calcoliamo la derivata

$$f'(x) = \begin{cases} 3(x-1)^2 & x > 1\\ 3(1-x)^2 & x < 1 \end{cases}$$

anche la derivata è sempre definita e i limiti destro e sinistro quando x tende a 1 sono entrambi uguali a 0.

**Esercizio 175.** Studiare la continuità e derivabilità della funzione  $f(x) = |x - 3| e^{\sqrt{x}}$ 

**Soluzione.** Il dominio della funzione è  $D:\mathbb{R}$  ed in esso è sempre continua. La funzione si riscrive come

$$f(x) = \begin{cases} (x-3)e^{\sqrt{x}} & x > 3\\ -(x-3)e^{\sqrt{x}} & x < 3 \end{cases}$$

calcoliamo le derivate

$$f(x) = \begin{cases} e^{\sqrt{x}} + \frac{(x-3)e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} & x > 3\\ -e^{\sqrt{x}} + \frac{(3-x)e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} & x < 3 \end{cases}$$

calcoliamo il limite destro e sinistro

$$\lim_{x \to 3^+} e^{\sqrt{x}} + \frac{(x-3)e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} = e^{\sqrt{3}}$$

$$\lim_{x \to 3^+} -e^{\sqrt{x}} + \frac{(3-x)e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} = -e^{\sqrt{3}}$$

avremo pertanto in x = 3 un punto angoloso.

### Crescenza e decrescenza di una funzione

Non richiamiamo il teorema che determina la condizione necessaria e sufficiente; ci limitiamo a ricordare che una funzione è crescente negli intervalli in cui la sua derivata prima è positiva, e decrescente negli intervalli in cui la funzione risulta negativa.

**Esercizio 176.** Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = x^2 - 2x + 3$  è crescente o decrescente.

Soluzione. Calcoliamo la derivata prima e studiamo la disequazione

$$f' = 2x - 2 > 0$$

la funzione sarà crescente per x > 1 e decrescente per x < 1.

Esercizio 177. Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 2x + 7$  è crescente o decrescente.

Soluzione. Calcoliamo la derivata prima e studiamo la disequazione

$$f' = x^2 - 4x + 2 > 0$$

applichiamo la formula risolvente alla equazione associata

la funzione sarà quindi crescente negli intervalli  $x<2-\sqrt{2} \ \lor \ x>2-\sqrt{2}$  e decrescente nell'intervallo interno  $2-\sqrt{2} < x < 2+\sqrt{2}$ 

**Esercizio 178.** Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{4x}$  è crescente o decrescente.

Soluzione. Calcoliamo la derivata prima e studiamo la disequazione

$$f' = \frac{8x^2 - 4x^2 + 4}{16x^2} = \frac{x^2 + 1}{4x^2} > 0$$

Il dominio della funzione derivata è  $D: \mathbb{R} - \{0\}$ . Risolviamo la disequazione fratta

$$\left\{ \begin{array}{ll} N>0 & \forall x\in D \\ D>0 & x\neq 0 \end{array} \right.$$

la funzione sarà crescente in tutto il suo dominio, cioè negli intervalli  $x < 0 \lor x > 0$ 

**Esercizio 179.** Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = \sqrt{4-x}$  è crescente o decrescente.

Soluzione. Il dominio della funzione è  $D:x\leq 4$ . Calcoliamo la derivata prima e studiamo la disequazione

$$f' = -\frac{1}{2\sqrt{4-x}} > 0$$

il dominio della funzione derivata è D: x < 4. Nel dominio, il denominatore è sempre positivo e la funzione sarà quindi sempre negativa, per cui sarà decrescente nell'intervallo x < 4.

52

**Esercizio 180.** Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-2}}$  è crescente o decrescente.

Soluzione. Calcoliamo Il dominio della funzione

$$\left\{ \begin{array}{ll} N \geq 0 & x \geq -1 \\ D > 0 & x > 2 \end{array} \right. \quad D: x \leq -1 \vee x > 2$$

Calcoliamo la derivata prima e studiamo la disequazione

$$f' = \frac{1}{2\sqrt{\frac{x+1}{x-2}}} \cdot \frac{-3}{(x-2)^2} = \frac{-3}{2(x-2)^2\sqrt{\frac{x+1}{x-2}}} > 0$$

il dominio della derivata è  $D: x < -1 \lor x > 2$ . Il numeratore è sempre negativo e il denominatore sempre positivo nel dominio, per cui la funzione è sempre decrescente negli intervalli  $]-\infty; -1[\cup]2; +\infty[$ .

**Esercizio 181.** Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos x - 1$  è crescente o decrescente.

Soluzione. Il dominio della funzione è R. Calcoliamo la sua derivata prima e studiamo la disequazione

$$f' = \sqrt{3}\cos x - \sin x > 0$$

$$\tan x < \sqrt{3}$$

la funzione è crescente negli intervalli  $\left]2k\pi; \frac{\pi}{3}+2k\pi\right[ \cup \left]\frac{4}{3}\pi+2k\pi; 2\pi+2k\pi\right[$ .

**Esercizio 182.** Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = \cos x - 3x$  è crescente o decrescente.

Soluzione. Il dominio della funzione è R. Calcoliamo la sua derivata prima e studiamo la disequazione

$$f' = -\sin x - 3 > 0 \qquad \sin x < -3$$

la disequazione è impossibile perché la funzione seno ha come codominio l'insieme [-1;1], per cui la funzione data è sempre decrescente.

Esercizio 183. Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$  è crescente o decrescente.

**Soluzione.** Il dominio della funzione è  $]0;+\infty[$ . Calcoliamo la sua derivata prima e studiamo la disequazione

$$f' = \frac{\frac{x}{x} - 1 - \ln x}{x^2} = -\frac{\ln x}{x^2} > 0$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} N>0 & 0 < x < 1 \\ D>0 & x \neq 0 \end{array} \right. \qquad 0 < x < 1$$

la funzione sarà crescente nell'intervallo ]0;1[ e decrescente nell'intervallo  $]1;+\infty[$ 

**Esercizio 184.** Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = x^2 - \ln(x^2 - 1)$  è crescente o decrescente.

Soluzione. Calcoliamo il dominio della funzione

$$x^2 - 1 > 0$$
  $x < -1 \lor x > 1$ 

Calcoliamo la sua derivata prima e studiamo la disequazione

$$f' = 2x - \frac{2x}{x^2 - 1} = \frac{2x(x^2 - 2)}{x^2 - 1} > 0$$

$$\begin{cases} N > 0 & -\sqrt{2} < x < 0 \lor x > \sqrt{2} \\ D > 0 & x < -1 \lor x > 1 \end{cases} \quad -\sqrt{2} < x < -1 \lor 0 < x < 1 \lor x > \sqrt{2}$$

pertanto la funzione sarà crescente negli intervalli  $]-\sqrt{2};-1[\,\cup\,]0;1[\,\cup\,]\sqrt{2};+\infty[$  e sarà decrescente negli intervalli  $]-\infty;-\sqrt{2}[\,\cup\,]-1;0[\,\cup\,]1;\sqrt{2}[$ .

Esercizio 185. Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = \ln^3 x - \ln^2 x$  è crescente o decrescente.

Soluzione. Il dominio della funzione è x > 0. Calcoliamo la derivata e studiamo la disequazione

$$f' = 3\frac{\ln^2 x}{x} - 2\frac{\ln x}{x} = \frac{\ln x}{x} (3\ln x - 2) > 0$$

il dominio della funzione derivata è ancora x > 0

$$0 < x < 1 \lor x > e^{\frac{2}{3}}$$

la funzione sarà crescente negli intervalli  $]0;1[\,\cup\,]e^{\frac{2}{3}};+\infty\,\Big[$  e decrescente nell'intervallo  $]1;e^{\frac{2}{3}}\Big[.$ 

**Esercizio 186.** Determinare gli intervalli in cui la funzione  $f(x) = (x-1)e^x$  è crescente o decrescente.

Soluzione. Il dominio della funzione è l'insieme R. Calcoliamo la derivata e studiamo la disequazione

$$f' = e^x + e^x (x - 1) = xe^x > 0$$

il dominio della funzione derivata è l'insieme  $\mathbb{R}$ .

$$\left\{\begin{array}{ll} x > 1 & \\ \forall x & x > 1 \end{array}\right.$$

la funzione è crescente negli intervalli  $]1:+\infty[$  e decrescente nell'intervallo  $]-\infty;0[$ 

Esercizio 187. Dopo aver determinato il dominio, il segno e l'insieme di derivabilità della funzione

$$f(x) = x\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)$$

dimostrare che è crescente in  $\mathbb{R}$ .

**Soluzione.** il dominio della funzione è  $\mathbb{R}$  essendo il radicando sempre positivo (somma di due quadrati). Calcoliamo il segno della funzione

$$x\left(x+\sqrt{1+x^2}\right) > 0$$

$$\begin{cases} x > 0 & \begin{cases} x > 0 \\ 1+x^2 > x^2 & \begin{cases} 1 > 0 \end{cases} & x > 0 \end{cases}$$

Calcoliamo la derivata prima

$$f' = 2x + \sqrt{1+x^2} + x\left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \frac{2x^2 + 2x\sqrt{1+x^2} + 1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}$$

il dominio della funzione derivata è ancora  $\mathbb{R}$ . il numeratore e il denominatore sono sempre positivi per cui il rapporto è sempre positivo e la funzione sarà sempre crescente. La funzione si annulla solo per x=0.

# Applicazione della derivata alle forme indeterminate: il teorema de l'Hôpital

Esercizio 188. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - x - 1}{x} \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{1} = 0$$

Esercizio 189. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{2}$$

Esercizio 190. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x + \sin x} \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^x \cos x}{1 + \cos x} = 0$$

Esercizio 191. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(e^x + x)}{x} \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \to 0} \frac{e^x + 1}{e^x + x} = 2$$

Esercizio 192. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\tan x}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{2\cos 2x}{1+\tan^2 x}=2$$

Esercizio 193. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln \sqrt{1 + \sin^2 x}}{1 - \cos x} \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^2 x}}{\sin x} = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} = 1$$

Esercizio 194. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3} - \tan x}{\sin \left(\frac{\pi}{3} - x\right)} \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x \to \frac{\pi}{3}} \frac{-\frac{1}{\cos^2 x}}{-\cos \left(\frac{\pi}{3} - x\right)} = \frac{-4}{-1} = 4$$

55

Esercizio 195. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{\tan 2x} \begin{bmatrix} 0\\0 \end{bmatrix} = \lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{\frac{2}{\cos^2 2x}} = \frac{0}{1} = 0$$

Esercizio 196. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x \to 2} \frac{4 - x^2 + \ln \sqrt{x - 1}}{x - \ln (5 - x^2) - 2} \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \to 2} \frac{-2x + \frac{1}{2(x - 1)}}{1 + \frac{2x}{5 - x^2}} = \frac{-\frac{7}{2}}{1 + 4} = -\frac{7}{10}$$

Esercizio 197. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin\sqrt{x}}{e^x-e^{-x}}\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}}{e^x+e^{-x}}=\frac{+\infty}{2}=+\infty$$

Esercizio 198. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x-1}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{1}=+\infty$$

Esercizio 199. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln \sin x}{\cot x} \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \to 0^+} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \to 0^+} \frac{-\sin 2x}{2} = 0$$

Esercizio 200. Calcola usando il teorema

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\ln\left(2e^x + 1\right)}{\sqrt{x^2 + 1}} \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \to \infty} \frac{\frac{2e^x}{2e^x + 1}}{\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}} = \lim_{x \to \infty} \frac{1}{1} = 1$$